

tenuiter filiformi-linearibus obtusis subtus puberulis vel glabratissimis, capitulis mediocribus obconicis, involuci crispule pubescentis phyllis rubello-marginatis ab externis brevissime lanceolatis acutis ad intima lanceolata acutiuscula elongatis, flosculis luteis externis involucro tertia parte longioribus, acheniis glabris angulatis tenuiter sulcatis, pappi sordide albi setis plumosis apice scabris ♀.

Hab. in Caucasi orientalis Daghestaniā supra Gimri 3600' in rupestribus imperviis (Rupr!), in ditione Gumbet prope Damech 5400' (Owerin!).

Scapi 3-6-pollicares, folia 2-4-pollicaria eis præcedentium multo tenuiora.

**44. S. Seidlitzii**, tota pilis longis flexuosis villosula nana, rhizomate verticali cespitoso, collo dense squamato, foliis omnibus radicibus brevibus linearibus canaliculato-planis obtusis, scapis monocephalidis folia non superantibus, capitulis parvis obconicis, involuci patule hirsuti phyllis linearis-lanceolatis obtusis elongatis externis parum brevioribus, flosculis luteis externis involucro sesquilongioribus, acheniis... ♀.

Hab. in Alpibus Alagös Armeniæ Rossicæ (cl. Nic. a Seidlitz!).

Folia pollicaria lineam lata supra basin petiolorum dilatatam subangustata, capitula *S. pygmaea*. Ab ea et affinis indumento villoso-hirsuto, phyllis valde elongatis distincta.

### § 5. Intricatæ.

**45. S. intricata** (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 9) adpressissime canescens, caulinis hornotinis e rhizomate suffrutescenti numerosis erectis pumilis a basi dichotome et stricte ramosissimis ramisque incrassatis sulcatis flexuosis, foliis inferioribus paucis anguste filiformi-plicatis, dichotomialibus breviter subulatis, capitulis minimis cylindricis paucifloris pedunculis rigidis demum incrassatis cylindricis suffultis, involuci adpresso puberuli phyllis paucis acutis ab externis triangularibus minimis ad interna lanceolata auctis, flosculis involucrum parum superantibus, acheniis glabris tenuibus sulcatis, pappi rufescens achenio sesquilongioris setis rufis paucis ad medium usque plumosis superne scabris ♂.

Hab. in Persiâ circa Ispahan (Auch. 3565! et 4889! et 4890!, Bunge!), in montibus ad Jezd (Buhse!).

Caules cum pedunculis 4-6-pollicares exsiccati plus minus persistentes, capitula florifera vix 4 lineas longa, achenium cum pappo 9-10 lineas longum. Pedunculis incrassatis insignis.

**46. S. tortuosissima**, adpresso canescens glauca, ramis e rhizomate suffrutescenti elongatis divaricatim ramosissimis infracto-flexuosis, foliis paucis inferioribus anguste filiformibus plicatis dichotomialibus minimis recurvis, capitulis parvis cylindrico-obconicis paucifloris pedunculis demum non incrassatis insidentibus, invo-