

- t. 17. f. 4. *S. trachysperma* Guss. pl. rar. p. 319. t. 58. Cor. purpureæ. Pappi setæ basi plumosæ apice simplices. Variat ex Guss. foliis pubescentibus à basi undulatis.
12. *S. PAPPOSA*, glabra, caule erecto ramoso, foliis margine crenato-undulatis oblongo-lanceolatis, summis linearibus integerrimis, capitulis longè pedicellatis oblongis, invol. squamis exter. latis subobtusis, achæniis tuberculato-echinulatis, pappi setis exter. densè et breviter barbato-plumosis confertis. \mathcal{L} in Syriâ ad Antab (olim Daba) legit cl. Ancher pl. exs. n. 4316! Cor. purpurascens. Fructus ferè *S. trachyspermae*, sed herba diversissima. (v. s. comm. à cl. inv.)
13. *S. INCISA*, caule erecto farinoso-pubescente parcè ramoso, foliis caulinis glabris oblongis acuminatis inciso-semipinnatifidis, infer. petiolatis, super. sessilibus semiamplexicaulibus, invol. oblongi squamis exter. latis subobtusis, achæniis lævibus. — in Cappadociâ ad Euphratem legit cl. Ancher pl. exs. n. 3315! Cor. ex sicco purpurascens. Capit. ferè *S. papposæ*. (v. s. comm. à cl. inv.)
14. *S. PARADOXA* (Fisch. et Mey. pl. Szow. ined.), floccoso-lanuginosa subglabra glauca, foliis integerrimis, radicalibus petiolatis ovatis acutis, caulinis lanceolatis subcordatis sessilibus, caulibus subsimplicibus sub-1-cephalis, pedunculis apice incrassatis, invol. squamis biseriatis ovatis, exterioribus multò brevioribus. — inter fragmenta lapidum ad lacum Ormiah in prov. Persiæ Aderbeischan. Flores purpurei.

** *Floribus flavis.*a. *Foliis subdentatis aut integris.*

15. *S. ANGUSTIFOLIA* (Linn. sp. 1113), radice cylindraceâ ad collum nudâ, caule 1-cephalo squamis linearibus tecto apice subincrassato et lanuginoso aut glabro, foliis infer. sessilibus linearibus subtrinerviis glabris, invol. ovali-oblongi squamis elongatis lanceolatis, achæniis striatis lævibus, \mathcal{L} in montosis Helvetiæ, collibus et planitiibus Galliæ in Burgundiâ, Lozerâ, Gallo-provinciâ, Vasconiæ subulosis, in Italiâ boreali, Dalmatiâ, etc. Gaud! fl. helv. 5. p. 19. DC. fl. fr. n. 2980. Affinis hinc *S. plantagineæ*, illinc tenuifoliæ. Synonymia intricata. Icones Gmelini et Kitabelii ad alteras species referendæ. Variat scapo apice lanuginoso. (v. v. et s.)
16. *S. PLANTAGINEA* (Schleich! pl. exs. Gaud. fl. helv. 5. p. 20), radice cylindraceâ apice nudâ, caule paucifolio 1-cephalo apice lanuginoso aut demùm glabro, foliis infer. petiolatis lato-lanceolatis 5-nerviis apice subcallosè acuminatis, invol. ovali-cylindrici squamis lanceolatis subobtusis floribus dimidiò brevioribus, achæniis striatis lævibus. \mathcal{L} in pratis humidis nemoribus montanis Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ. *S. humilis* Willd. sp. 3. p. 1499. excl. Clus. syn. Horn. fl. dan. t. 1653. *S. glastifolia* Heg. helv. 2. p. 157. *S. nervosa* & Poir. dict. 7. p. 22. (v. v. et s.)
17. *S. SEMIGANA*, radice cylindraceâ carnosâ, caule erecto folioso polycephalo apice præsertim pedicellis que cano-subtomentosis, foliis lanceolatis antheseos tempore glabriusculis, invol. subcanescentis erecti squamis latis adpressis, achæniis muricatis. \mathcal{L} in montibus Asiæ minoris propè Mardin legit cl. Ancher pl. exs. n. 3335! Radix esculenta. Folia inf. basi attenuata, super. sessilia semiamplexicaulia. Pedicelli nudi axillares folio longiores. Folia juniora vid. canescentia, adulta glabra. Flor. flavi. (v. s. comm. à cl. inv.)
18. *S. ARISTATA* (Ramond in DC. fl. fr. 1805. v. 4. p. 922), glabra, radice cylindraceâ ad collum nudâ, foliis radicalibus lineari-sublanceolatis valdè elongatis 3-5-nerviis integerrimis ad basin araneosis, caule 1-cephalo sub capitulo parcè lanuginoso, invol. ovali squamis exter. pluribus elongatis laxis margine membranaceis, achæniis tuberculato-muricatis. \mathcal{L} in pratis alpinis Pyrenæorum locis dictis Pic d'Ereslids, Esquieri, etc. *S. grandiflora* Lapeyr. abr. (1813) 479 ex Benth. (v. v. et s.)
- β. *Alpina*, foliis caule dimidiò ferè brevioribus, invol. squamis 2 angustò-