

S. J. LIPSCHITZ

FRAGMENTA MONOGRAPHIAE
GENERIS SCORZONERA

- * Листья цельнокрайние, вырезные или по краю \pm заостренно-зубчатые . . . 5.
 3. Цветы фиолетовые или розовые, листья мучнисто-опушенные 4.
 * Цветы желтые, у перехода язычка в трубку черно-пурпуровые. Листья под
 лупой опушенные звездчатыми волосками

(2) *Scorzonera calyculata* Boiss.

4. Листья твердые, кожистые, сильно мучнисто-опушенные, нервы, за исклю-
 чением среднего, слабо заметные. Листочки обертки туповатые. Корневая шейка
 сильно утолщена от густо окружающих ее остатков влагалищ прошлогодних листьев.
 Хохолок грязный

(3) *Scorzonera incisa* DC.

- * Листья мягче, слегка опушенные, позднее оголенные. Стержень листа с ясно
 заметными нервами, верхняя часть его переходит в верхушечную заостренную долю.
 Листочки обертки заостренные. Корневая шейка почти голая, не утолщенная от
 окружающих ее остатков влагалищ. Хохолок снежнобелый

(4) *Scorzonera lacera* Boiss. et Balansa.

5. Цветы желтые, у перехода язычка в трубку черно-пурпуровые. Листья
 твердые, но не кожистые 6.
 * Цветы розовые или фиолетовые. Листья кожистые

(3) *Scorzonera incisa* DC.

6. Стеблевые листья стеблеобъемлющие, с ушками 7.
 * Стеблевые листья сидячие, но не стеблеобъемлющие, без ушков. Растения
 Персии

(2) *Scorzonera calyculata* Boiss.

7. Растения Сирии. Опушение сильно развито, стебли сильно олиственные,
 стеблевые листья крупные. Бугорки на ребрах семянки острые

(5) *Scorzonera libanotica* Boiss.

- * Растения Турецкой Армении и Кавказа. Опушение слабо развито, стебли
 скудно олиственные, стеблевые листья по направлению кверху постепенно уменьшаю-
 щиеся; бугорки на ребрах семянки тупые

(6) *Scorzonera bicolor* Freyn. et Sint. (= *Scorzonera Karjagini* Grossh.).

СЕРИЯ BREVICAULIS

Габитуально весьма сходственна с секцией *Incisa*, отстоит далеко от пред-
 ставителей настоящих „классических“ *Podospermum*, поэтому рассматривается нами
 в одном фрагменте с секцией *Incisa*. Характеризуется крупными, до 2 см длины,
 сеянками с расширенным, имитирующим ножку основанием, по ребрам негусто
 усаженными мягко-игльчатыми бородавками. Язычковые цветы желтые, в зеве черно-
 пурпуровые и здесь с бородкой из волосков. Обертка по краю мозолевидно-утол-
 щенная. Один вид в пределах Северной Африки.

Ser. Brevicaulis, ser. nova. Achenia 2 cm longa basi stipite subinflato suf-
 fulta, costis muricatis, scaberrimis. Ligula flava fauce atropurpurea et hic dense bar-
 bellata pilis subflexuosis obsita. Involucri phylla rubro-marginatis, marginibus calloso-
 incrassatis. Species unica Africae borealis incola. Habitu valde species sectionis *Incisae*
 accedens, sed acheniis forma atque structura ab ea differt. Ab omnibus *Podospermis*
 habitu et notis supra citatis satis diversa.

1. *Scorzonera brevicaulis* Vahl. Symb. 2, 1791, t. 44, p. 88 (tabula bona,
 sed figura involucris squamarum mala). — *Scorzonera coronopifolia* Desf. Flora Atlantica II,
 1800, p. 220, tab. 212 (in DC. Prodr. errone citatur t. 44). — DC. Prodr. VII,
 1838, p. 123, № 41. — *Scorzonera laciniata* Vahl. (herb. — apud DC. op. cit.).

Icon.: conf. tab. nostra № 32, 33, 34.

В гербарии БИН хранятся три листа с этикеткой, писаной на листе „e Tunis
 Vahl“ — два из гербария Шумахера, один из гербария Ледебера. На одном гербарном
 листе, экземпляр которого весьма напоминает изображение, приведенное в творении