

*Caules pauci vel numerosi ramosi, crebre vel sparse foliosi. Folia radicalia caulinaque lanceolata vel linearia, multinervosa. Calathidia solitaria vel numerosa. Achenia glabra vel pubescentia, pappus rubro-bruneus vel albus.*

Тип (typus): *Scorzonera Koslovskyi* Sosn.

Ряд (Series) 3. *Koslovskiana* Lipsch. во Фл. СССР, XXIX (1964) 76; Addenda XXVIII, 720.

Тип (typus): тип секции.

### 5. *Scorzonera Koslovskyi* Sosn.

Сосновский в Гроссгейм Фл. Кавк. IV (1934) 241; Липш. Фрагм. моногр. *Scorzonera* I (1935) 42; он же во Фл. СССР XXIX (1964) 76; Кутателадзе в Опред. раст. Грузии II (1969) 179; она же в Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 28 (1970) 53. - S. debilis Sosn. в Тр. Тбил. бот. инст. II (1937) 222; Гроссг. Опред. раст. Кавк. (1949) 511; Папава во Фл. Грузии VIII (1952) 648.

Ic.: Липш. I.c. 1935, табл. 15.

Тип (typus): Prov. Tiflis, distr. Achalkalaki, in jugo Tetrob. 30.VIII.1930 W. Koslovsky (TBI!)

Изученные экземпляры: (*specimina examinata*): Джавахетия, Тетроби 15.IX.1931 Кецховели (TBI); Тетробо-Чобаретское лесничество Ахалкалакского района, ЮЗ Грузия у вершины южного склона Чобаретского хребта 7.VIII.1932 №403 Медведев (MW); Джавахетия на г. Тетроби 24.VII.1967 Лачашвили, Кутателадзе (TBI); Джавахетия на хребте Тетроби 19.VII.1969 Хинтибидзе (TBI); Бакурианский Ботанический сад (перенесен с хр. Тетроби) 1.VIII.1967 Григалашвили и Ш. Кутателадзе (TBI). Карта 2.

Географическое распространение (ar. geogr.): Юго-Западное Закавказье. Эндем.

Ряд (Series) 4. *Safievia* nae Kuthath.  
ser. novā

Стебли многочисленные, густо олиственные. Листья линейно-ланцетные, 3-7-нервные. Семянки опущенные. Щетинки хохолка белые или грязно-желтые.

*Caules numerosi dense-foliosi. Folia anguste-lanceolata, 3-7 - nervis. Achenia pubescentia. Pappus albus vel sordido-luteus.*

Тип (typus): *S. Safievii Grossh.*

6. *Scorzonera Safievii Grossh.*

Гроссг. в Бот. сборн. Аз ГНИИ, 1 (1932) 51 descr. ross.; он же в Тр. Азерб. отд. Закавк. Фил. АН СССР, сект. бот. I (1933) 63 descr. lat.; он же Фл. Кавк. ТУ (1934) 237; Липш. Фрагм. моногр. *Scorzonera* 1 (1935) 138; Гроссг. Опред. раст. Кавк. (1949) 509; Липш. во Фл. СССР XXIX (1964) 101.

Ic.: Липш. l.c. 1935, табл. 47.

Тип (typus): Armenia. Daralaghez in m-te Tekke-Donduran in rupestribus siccis 8.VIII.1931. fl., fr. Karjagin et Safiev (ВАК!).

Изученные экземпляры (*specimina examinata*): Армения. Дарагез, гора Теке-Дондуран сел. Алагез 8.VIII.1931 И. Карягин (MW); Дарагез. Окрестности сел. Гнишик 2000 м Фригана. 21.VII.1950 Ахвердов (ЕРЕ); Дарагез. Левый берег ущелья Алагез 2000-2100 м. Фригана. 18.VII.1950 А. Ахвердов (ТВI). Карта 2.

Географическое распространение (ar. geogr.): Южное Закавказье. Эндем.

Примечание. До настоящего времени *S. Koslovskyi Sosn.* и *S. Safievii Grossh.* С.Ю. Липшичем были отнесены в разные секции рода *Scorzonera*, а именно, первый в sect. *Pulvinares* (Boiss.) Lipsch., второй в sect. *Nervosae* Lipsch.

В результате тщательного изучения обширного гербарного материала по названным видам мы убедились в том, что по характерным морфологическим признакам их следует выделить в особую секцию — *Angustifoliae*