

DIAGNOSES PLANTARUM NOVARUM
IN TOMO XXIX FLORAE URSS COMMEMORATARUM

(ДИАГНОЗЫ НОВЫХ ВИДОВ, УПОМИНАЕМЫХ
В ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОМ ТОМЕ)

Martio 1964

SCORZONERA L.

Subgenus *Podospermum* (DC.) Lipsch.

1. Series 1. *Laciniatae* Lipsch. — Plantae biennes caulibus evolutis foliatis.
Achenia cylindrica glabra.

Seriesi typus: *S. laciniata* L.

2. Series 2. *Armeniacaе* Lipsch. — Plantae perennes. *Achenia saepe pilosa dimorphaque: externa — dilatata et alata, interna — tenuiora aptera.*

Seriesi typus: *S. armeniaca* (Boiss. et Huet) Boiss.

3. Series 3. *Schischkinianae* Lipsch. — Plantae perennes. Collum radices pluriceps. Caules evoluti foliati. Calathidia minuta (ca. 8 mm lata in florescentia). *Achenia glabra cylindrica.*

In declivibus praemontanis distributae.

Seriesi typus: *S. Schischkinii* Lipsch. et Vass.

4. *S. Schischkinii* Lipsch. et Vass. sp. n. — *Podospermum Schischkinii* Vass. in *Госстр. Опред. раст. Кавк.* (1949) 508, descr. ross.

Rhizoma crassum pluriceps; tota planta subglabra vel praesertim in parte inferiore paulo arachnoidea; caules (10) 15—25 cm alt., numerosi, tenues virgati, ramosi, foliati; folia pinnatisecta, basalia et caulina inferiora numerosa, petiolata, petiolis in vaginas dilatatis; radices collum vaginis petiolorum vetustorum dense vestitum; segmenta foliorum lateralia non numerosa plus minusve elongata angusta (1 mm lat.); folia caulina superiora diminuta, sessilia, integra basi duplo dilatata rix semiamplexicaulia. Calathidia numerosa ad apices caulis et ramorum solitaria anguste cylindrica minuta, 10—15 mm long., 3—4 mm lat. (in florescentia); involucrem griseo-tomentosum, phyllariis externis elongato-ovatis, internis oblongo-lanceolatis duplo longioribus; flores ligulares lutei, involucre paulo longiores, ligulae profunde fissae subfimbriatae; achenia 9—10 mm long. glabra anguste cylindrica costulata, basi clavulata paulo curvata, stipite 1.5—1.75 mm long.; pappus sordide albus achenium aequans setis plumosis. Fl. VI—VII.

13. Series 10. **Bracteosae** Lipsch. — Calathidia foliis bracteiformibus suffulta. Folia late vel ovato-lanceolata, 2.5—4 cm lat.

Seriei typus: *S. bracteosa* Winkl.

14. Series 11. **Tragopogonoideae** Lipsch. — Calathidia foliis bracteiformibus non suffulta. Folia linearia graminoides ca. 2 cm lat. Flores ligulares rosei.

Seriei typus: *S. tragopogonoides* Rgl. et Schmalh.

15. Series 12. **Subacaules** Lipsch. — Plantae plus minusve pubescentes, subacaules vel caules humiles pubescentes scapiformes. Calathidia magna ca. 5 cm long. Phyllaria plus minus pubescentia.

Plantae alpinae.

Seriei typus: *S. subacaulis* Lipsch.

16. Series 13. **Austriacae** Lipsch. — Plantae glabrae. Caules distincte evoluti, glabri. Phyllaria glabra.

In regionibus stepposa, silvatico-stepposa et silvatica distributae.

Seriei typus: *S. austriaca* Willd.

17. Series 14. **Filifoliae** Lipsch. — Caules scapiformes, pauci. Folia angusta, filiformi-linearia. Radicis collum vaginis foliorum vetustorum non dense vestitum. Achenia glabra vel pubescentia.

Seriei typus: *S. filifolia* Boiss.

18. Series 15. **Rigidae** Lipsch. — Caules scapiformes, altiores, numerosi, stricti. Radicis collum vaginis induratis dense vestitum. Folia linearia, angusta.

Seriei typus: *S. rigida* Auch. ex DC.

19. Series 16. **Koslovskyanae** Lipsch. — Caules scapiformes, distincte foliati. Folia lanceolata. Pappi setae rubiginosae.

Seriei typus: *S. Koslovskyi* Sosn.

20. Series 17. **Parviflorae** Lipsch. — Radicis collum non incrassatum. Caules simplices foliis uno-tribus squamiformibus, calathidio uno raro duobus praediti.

Seriei typus: *S. parviflora* Jacq.

21. Series 18. **Mongolicae** Lipsch. — Radicis collum propter vaginas vetustas induratasque plurimas foliorum radicalium incrassatum. Caules ramosi, foliati, calathidiis non multis (usque ad sex) praediti.

Seriei typus: *S. mongolica* Maxim.

22. Sectio 9. **Turkestanicae** Lipsch. — Caules erecti vulgo valde ramosi, foliati. Folia linearia vel late lanceolata. Calathidia in racemo disposita, multiflora vel pauciflora. Involucrum multiseriale. Flores ligulares lutei vel aurantiaci. Ache-