

- β. *lanceolata*, foliis lanceolato-ovatis acutis. ♀ S. tomentosa Willd. sp. 3. p. 1498. Pappus dicitur capillaris scaber, et ideo (si descr. exacta) à genere fortè aliena.
- γ. *linearis*, foliis lineari-lanceolatis apice subcallosis obtusis velutino-tomentosis. ♀ in Oriente. Radix lignosa apice multiceps. Folia 1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 2 lin. lata. Capitula lateralialia pedicello suo longiora. Invol. squamis paucis, ext. dimidiò brevioribus. Pappus more Scorzonerae plumosus. (v. s.)
38. S. SERICEA (Auch. pl. exs. n. 3307), acaulis pluriceps, foliis radicalibus linearibus integerrimis strictis apice subcallosis utrinque adpressè sericeis, scapis folio vix longioribus sericeo-villosis 1-cephalis, invol. squamis glabris linearibus acuminatis. ♀ in excelsioribus montibus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Herba 3-poll. Habit. ferè Gelasiae, sed pappi setae basi plumosae. Achaenia glabra. (v. s. comm. à cl. inv.)
39. S. VELUTINA, tota tomento velutino cana, radice cylindracea, foliis radicalibus lanceolatis linearibusve integerrimis acutis, caulibus folio brevioribus simplicibus 1-cephalis basi folia 1-2 gerentibus, invol. squamis vix acutis erectis dorso lanato-canis. ♀ in Syria legit cl. Aucher pl. exs. n. 3312! An adhuc S. tomentosae var.? Pappus rufidulus basi plumosus. Cor. flavæ. Folia 2-3 poll. longa. Capitula duplò majora quam in S. tomentosae var. γ. (v. s. comm. à cl. inv.)
40. S. FISTULOSA (Brot. fl. lus. 1. p. 329), glabra, caule ascendente articulo fistuloso, foliis fistulosis cylindraceis apice subulatis, pedunculis apice subvillosis, invol. squamis subcarinatis. ♀ in humidis et graminosis Lusitaniae prov. Beira. Cor. stramineo-luteæ. Radix fibrosa repens. Achaen. et papp. indescr.

b. *Foliis pinnatifidis.*

41. S. CORONOPIFOLIA (Desf. fl. atl. 2. p. 220. t. 44), pubescenti-subtomentosa, caule erecto subsimplici 1-cephalo basi folioso, foliis lanceolatis, aliis indivisis, plerisque rachi latè pinnatifidis, lobis linearibus inaequalibus, invol. squamis mucronatis, exter. ovatis. ♀ in montibus Tunetanis (Vahl!) et Algeriensibus (Desf.), S. brevicaulis Vahl symb. 2. p. 88. t. 44. S. laciniata Vahl! herb. Folia ferè Podospermi, sed invol. et fructus (immaturus equidem) Scorzonerae. Cor. flavæ ad faucem barbatae. (v. s. specim. à Vahl ad L'Hér. miss.)
42. S. CALVESCENS, foliis ad collum confertis rigidulis pinnatipartitis, lobis rachi què linearibus subcanaliculatis, junioribus tomentosis, adultis glabris, scapo 1-cephalo tomentoso foliis brevioribus, invol. squamis ovato-oblongis acutis, exterioribus tomentosis, inter. glabris. ♀ in insulâ Scio leger. cl. Olivier et Brugiere. Herba vix 3-poll. Flores lutei. Fol. lobi 3-4-jugi, lobo terminali cæteris triplò longiore incurvo. (v. s.)

Sect. II. GELASIA. — Gelasia *Cass. bull. phil. mart.* 1818. *dict. sc. nat.* 18. p. 285. 42. p. 81. — Galasia *Less. syn.* 134.

Pappus inaequalis, setis ad medium usque plus minus scabris nec verè plumosis. Achaenia glabra.

43. S. PYGMÆA (Sibth. fl. græc. t. 783. ined. ex Smith. prod. 2. p. 122), acaulis, scapo subnudo 1-cephalo longitudine foliorum aut paulò longiore, foliis linearibus acuminatis canaliculatis suprâ sublanatis, invol. squamis acuminatis extus pubescentibus ♀ in Olympi Bithynici cacumine (Sibth. Auch.!). Herba vix 3-poll. Radix longa sublignosa ad collum multiceps. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. Aucher sub n. 3308.)
44. S. RIGIDA (Auch. pl. exs. n. 3309), acaulis, foliis radicalibus linearibus integerrimis rigidulis utrinque tomento adpresso canis, scapis folia quadruplò superantibus nudis 1-cephalis, invol. squamis dorso subincanis lineari-lanceolatis acuminatis margine subscariosis. ♀ in montibus excelsioribus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Folia 2 poll. longa, lineam lata. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. inv.)