

5. *T. MAJOR*: calycib. radio longioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollis ad apicem rotundatis. *Murr. Syst.*
Hab. in prat. German., Austr. ♂. D.
6. *T. PORRIFOLIUS*: calycib. corolla planissimæ radio longioribus, corollulis angustissimis truncatis, pedunculis superne incrassatis, caule stricto. *Jaqu.*
Hab. in Europ. pratis. ♂. D.
7. *T. ANGUSTIFOLIUS*: calycib. 8 - 10 - phyllis radio longioribus, foliis integris strictis glabris. *W. Sp.*
Hab. in Italia. ♂. D. intr. 1810.
8. *T. CROCIFOLIUS*: calycib. 5 - phyllis radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculisque basi villosis. *W. Sp.*
Hab. in Ital., Gall. austr. ♂. D. intr. 1802.
9. *T. VILLOSUS*: calycib. radio sesquilongioribus, caule foliisque villosis. *Lin.*
Hab. in Hispan., Sibir. ♂. D. intr. 1802.

906. ARNOPOGON.

1. *A. DALECHAMPII*: calycib. pubescentibus inermibus, foliis runcinato - dentatis. *W. Sp.*
Hab. in Eur. austr. ♀. F.
2. *A. PICROIDES*: calycib. hispido - aculeatis, foliis runcinatis denticulatis, caulinis basi dilatatis. *W. Sp.*
Hab. in Gall. austr., Creta. ♂. D.

907. SCORZONERA.

1. *S. AUSTRIACA*: caule subnudo 1 - floro calycinisque squamis glabris, foliis lineari - lanceolatis. *W. Sp.*
Hab. in Austr., Helvet. ♀. D. intr. 1807.
2. *S. HUMILIS*: caule subnudo - subunifloro calycinisque squamis lanatis, foliis oblongo - lanceolatis nervoso - planis. *W. Sp.*
Hab. in prat. Eur. septentr. ♀. D. intr. 1797.

3. *S. HISPANICA*: caule ramoso, foliis amplexicaulis lanceolatis integris basi subserulatis. *W. Sp.*
Hab. in Hisp., Hung., Sibir. Z. D.
4. *S. RUMICIFOLIA*: caule ramoso superne squamoso foliisque glabris; radicalibus ovato-lanceolatis caulinis lanceolato-ensiformibus, radio calyce longiore.
Hab. — — Z. D. missa 1807. sub hoc nomine ab illustr. Balbisio.
5. *S. ROSEA*: foliis lanceolatis linearibus planis: caulinis carinato-linearibus, caule multifloro. *W. Sp.*
Hab. in German., Hung., Carn. Z. D. intr. 1803.
6. *S. PURPUREA*: foliis lineari-subulatis canaliculato-triquetris, caule ramoso. *W. Sp.*
Hab. in Austr., Sibir. Z. D. intr. 1801.
7. *S. ANGUSTIFOLIA*: foliis subulatis integris, pedunculis incrassatis, caule basi villosa. *Lin.*
Hab. in Europ. austr. Z. D. intr. 1803.
8. *S. STRICTA mihi*: caule simplici multifloro, foliis lineari-subulatis carinatis basi sublanatis strictis, pedunculis longissimis subnudis, calycibus glabris.
Hab. — — Z. D. intr. 1809. ex horto Gorink. sub nom. S. angustifol. — Accedit ad S. villosam, sed differt caule superne calycibusque glabris, floribus majoribus et denique toto habitu.
9. *S. VILLOSA*: foliis linearibus carinatis villosis, caule ramoso. *W. Sp.*
Hab. Tergesti. Z. D. intr. 1805.
10. *S. ERIOSPERMA*: foliis linearibus acuminatis carinatis basi lanatis, caule ramoso, calycibus incanis, seminibus tomentosis. *W. Sp.*
Hab. ad Mare Caspium. Z. D. intr. 1801.
11. *S. RESEDIFOLIA*: foliis linearibus dentato-pinnatifidis glabris, calycibus apice albido-cartilagineis, caule erecto. *V. S.*
Hab. in Eur. austr., Oriente. Z. D. intr. 1806.