

6. *majus*, calycib. coroll. radio longioribus, fol. integris strictis, pedunculis superne incrassatis, corollulis ad apicem rotundatis. L. Jacq. austr. 1. t. 29. Lam. ill. t. 646. f. 1. Hab. in pratis, vineis, collibus apricis. ♂

7. *foccosum*, tomentosum = floccosum, cal. cor. radio brevioribus, fol. linearibus canaliculatis, caulinis revolutis. Plant. rar. hung. 2. p. 116. t. 112. Cresc. in Hungariae sabulosis. Caul. 2-4-pedalis, subflexuosus. Cal. 8-phyllus. Cor. flava. ♂

8. *porrifolium*, calycib. coroll. planissimae radio longioribus, corollulis angustissimis truncatis, pedunc. superne incrassatis, caule stricto. Jacq. ic. rar. 1. t. 139. Moris. 3. p. 7. s. 7. t. 9. f. 5. Hab. in collibus, pratis. Flor. purpurei. ♂

9. *crocifolium*, calycib. pentaphyllis corollae radio longioribus, fol. integris, radicalibus pedunculisque basi villosis. Willd. Col. ephr. 1. p. 229. t. 230. Hab. in Italia, Monspeli. Flor. violacei. ♂

10. *angustifolium*, calycib. octophyllis cor. radio longioribus, fol. integris strictis glabris. Willd. Hab. in comitatu Nicaeensi. Caul. quadriuncialis. Var. prioris? †

11. *villosum*, calycib. coroll. radio sesquilongioribus, caule folisque villosis. L. Hab. in Hispania, Sibiria. Cal. enneaphyllus. Flos expansus subnutans est. L. ♂

1759. **TROXIMON.** Cal. oblongus, conicus, simplex, vel squamis inaequalibus imbricatus. Recept. nudum, puncticulatum. Pappus sessilis pilosus. (Spec. Tragopogi. L.)

1. *virginicum*, fol. radicalibus lyratis rotundatis, caul. amplexicaulib. indivisis, caul. bifido subnudo. Tragopogon virginic. L. Hyoseris prenanthoides. Willd. Sp. III. p. 1675. Hyoseris amplexicaulis. Michaux? Hab. in Amer. Loreali. Totum glabrum.

2. *Dandelion*, fol. ensiformibus integris laevibus, scapis radicalibus. L. Willd. p. 1495. Leontodon. Gron. virg. 114. Hab. in Virginia. Fol. glabra.

3. *lanatum*, fol. ensiformibus undatis villosis, scapis radicalibus. L. Habit. in Oriente, Palaestina.

Obs. Species hujus generis, observante b. Gaertnero, (de fruct. et sem. pl. 2. p. 361.) ab autopsi curatius scrutandae.

1760. **ARNOPOGON.** Cal. monophyllus, octopartitus, turbina-tus. Recept. nudum. Pappus plumosus, stipitatus. Sem. transverse sulcata. (Tragopogi. Spec. L.)

1. *Dalechampii*, calycib. pubescentibus inermibus, fol. runcinato-dentatis. Willd. Sp. III. p. 1496. Gaertn. 2. p. 369. t. 159. Tragopogon. L. Urospermum. Juss. Desf. Barr. rar. 1043. t. 209. Hab. in Hispania, Gallia meridionali. Pl. grandis. Cor. subtus purpurea. ¶

2. *picroides*, calycib. hispido-aculeatis, fol. runcinatis denticulatis, caulinis basi dilatatis. Willd. Lam. ill. t. 646. f. 3. Hab. in Creta, Monspeli. Var. fol. integris. ☉

3. *asperum*, calycib. hispido-aculeatis, fol. integris, caulinis oblongis basi attenuatis. Willd. Hab. Monspeli. Fol. sudentata, hirta. Pl. pusilla, prioris var.?

4. *capense*, calycib. hispido-aculeatis octangulatis profunde partitis, fol. runcinato-dentatis. Willd. Jacq. ic. rar. 3. t. 577. Collect. 2. p. 320. Hab. ad Cap. b. sp. Cal. laciniis carinatis. ♂

1761. **SCORZONERA.** Cal. imbricatus, squamis margine scariosis. Recept. nudum. Pappus plumosus, substipitatus.

1. *tomentosa*, fol. ovatis nervosis tomentosiss integerrimis sessilibus. L. Hab. in Armenia. Caul. et Fol. fere ut in Gentiana asclapiadea. Willd.

2. *nervosa*, caule subnudo subunifloro, calycinisque squamis lanatis, fol. oblongo-lanceolatis nervosis planis. S. humilis. Willd. Sp. III. p. 1499. Enc. bot. 7. p. 21. Hab. in Eur. septentrionalioris pratis apricis. Caul. interdum multiflorus. ¶

\* *humilis*, caule subnudo unifloro calycinisque squamis glabris, fol. lineari-lanceolatis. Willd. p. 1498. S. humilis. Jacq. austr. t. 36. Hab. in collibus et pratis apricis Austriae, Helvetiae, Lusitaniae. ¶

3. *hispanica*, caule ramoso, fol. amplexicaulib. lanceolatis integris, basi subserrulatis. Willd. Lam. ill. gen. t. 647. f. 5. Gaertn. de fr. 2. p. 367. t. 159. Hab. in Hispania, Gallia meridionali, Hungaria, Sibiria. Usui culinari inservit. ¶

4. *glastifolia*, caule subunifloro folioso, fol. lineari-lanceolatis acuminatis glabris nervosis planis. Willd. S. graminifolia. Roth. germ. II. p. 249. Hab. in Ger-



maniae, Bohemiae, Silesiae collibus. Planta polymorpha, similis *S. hispanicae*. ¶

5. *caricifolia*, caule subunifloro folioso adscendente, fol. lanceolato-ensiformibus glabris nervosis planis, radio calyce longiore. Willd. Pall. it. 3. app. n. 131. t. J. i. f. 1. Hab. in depressis humidis, subsalsis Sibiriae. Simillima *S. parviflorae*. ¶

6. *parviflora*, caule ramoso basi folioso, fol. lanceolato-ensiformibus glabris nervosis planis, radio calyce brevior. Willd. Jacq. austr. 4. t. 305. Hab. in pratis humidis Austriae, Pannoniae. ¶

7. *undulata*, fol. lineari-lanceolatis attenuatis tomentosius undulatis, caule subramoso. Vahl. symb. 2. p. 86. Desf. atl. 2. p. 219. Lam. ill. t. 647. f. 2. Hab. in arenosis Barbariae, Graeciae. ¶

8. *purpurea*, fol. lineari-subulatis canaliculato-triquetris, caule ramoso. Willd. Lam. ill. t. 647. f. 3. Hab. in Austria, Sibiria et Barbaria. Cor. coeruleo-carnea. ¶

9. *rosea*, caul. basi ramoso, fol. lanceolato-linearibus planis margine scabris, caulinis carinato-linearibus, pedunc. elongatis subaphyllis. Pl. rar. hung. 2. p. 127. t. 121. *S. purpurea*. Scop. carn. n. 404. t. 46. Hab. in nemoribus Marchiae Brandenburgicae, in alpihus Hungariae. Carnioliae. Flor. magni. Prioris var.? ¶

10. *aristata*, fol. linearibus glabris, cal. squamis inferioribus foliaceis: laxis subulatis flor. aequantibus, caul. subnudo unifloro. Decand. Syn. p. 265. Hab. in Pyrenaeorum herbis.

11. *graminifolia*, fol. lineari-ensiformibus acuminatis rigidis nervosis carinatis, calycibus villosis basi foliosis, caule subramoso. Willd. Jacq. obs. 4. p. 13. t. 100. *Podospermum subulatum*. Decand. Flor. franç. 4. p. 61. Hab. in Lusitania, Sibiria et Gallia? ¶

12. *angustifolia*, fol. subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villosa. L. Plant. rar. hung. 2. p. 128. t. 122. β. *S. graminifolia*. Allion. Pedem. n. 839. Hab. in Hispaniae, Monspeli et Austriae collibus. Cor. lutea, subtus purpurascens. Recept. subfavosum. ¶

13. *tuberosa*, caule unifloro folioso, fol. linearibus subtus pubescentibus, radice tuberosa. Willd. Pall. it. 3. app. n. 131. t. Y. f. 3. Hab. in aridissimis limosis ad Volgam australem et in Syria. ¶

14. *pusilla*, fol. glabris apice circinnatis, caule ramoso. Willd. Pall. itin. 2.

app. n. 122. t. L. Hab. in promontoriis circa mare Caspium. Flor. radio non expanduntur. ¶

15. *fistulosa*, caul. adscendente articulato fistuloso, fol. fistulosis ad apicem subulatis, cal. foliol. subcarinatis. Brot. Flor. Lusitan. t. p. 329. Hab. in Lusitaniae humidis et graminosis.

16. *pinifolia*, fol. subulatis acutis, calycibus lanatis, caule unifloro tomentoso. Willd. Barr. ic. 496. Hab. in Hispania et Gallia australi. ¶

17. *hirsuta*, fol. linearibus cauleque unifloro hirsutis. L. *S. eriosperma*. Gouan. illustr. 52. *Hieracium capillaceum*. All. Pedem. t. 31. f. 33. Hab. in Apulia, Gallia, Oriente. Semina hirsuta. Var. caul. glabro.

18. *eriosperma*, fol. linearibus acuminatis carinatis basi lanatis, caule ramoso, calycibus incanis, seminibus tomentosius. Willd. Marsch. à Bieberstein casp. 117. n. 28. Hab. in graminosis arenosis montium ad mare Caspium. ¶

19. *villosa*, fol. linearibus carinatis villosis, caule ramoso. Willd. Scop. carn. t. 46. Hab. Tergesti.

20. *cretica*, fol. linearibus planis subciliatis, caule basi ramoso, seminibus tomentosius. Willd. p. 1504. Tournef. cor. 36. Hab. in Creta. ¶

21. *stylosa*, fol. lanceolatis serrato-sinuatis pubescentibus, caul. squamoso basi villosa, stylis longe prominentibus. H. P. Pulchra spec. Cal. foliol. lata ovata, albicantia, summo sublinearia, margine ciliata. Caul. nudus.

22. *capensis*, fol. lineari-lanceolatis glabris, caule paniculato. Thunb. prod. p. 141. Hab. ad Cap. b. spei.

23. *chondrilloides*, fol. linearibus obtusis subdentatis, caule ramosissimo, pedunculis squamosis. Willd. p. 1503. Hab. in Hispania. Pourret. Facie Chondrillae.

24. *calcitrapifolia*, fol. inferioribus lyratis: laciniis oblongis mucronatis; superioribus pinnatifidis. Vahl. symb. 2. p. 87. Retz. obs. 3. p. 42. Barr. ic. 800. Hab. in Africa boreali, Oriente. ¶

25. *resedifolia*, fol. linearibus dentato-pinnatifidis glabris, calycibus apice albidocartilagineis, caule erecto. Vahl. symb. 2. p. 87. Boec. sic. 13. t. 7. f. a. et c. a. Hab. in Hispania, Gallia, Oriente. Caul. divaricatus. ¶

26. *laciniata*, fol. inferioribus pinnatifidis linearibus, superioribus linearibus,