

basi attenuatis obtusiusculis 5-7 nerviis, superioribus ad pedunculorum basin subulatis brevissimis, pedunculis incurvis capitulo subrotundo 3-plo longioribus flexuosis parce squamulosis, involucri glabri *squamis omnibus acuminatis, exterioribus caeteris paulo tantum brevioribus, floribus luteis, acheniis*

Hab. in *Persia* prope *Ispahan* Aucher No. 4897.

Planta sesquipedalis, caulis striatus gracilis, capitula illis *Sc. ensifoliae* et *paniculatae* dimidio minora. Ab eis praeter indumentum, folia tenera obsolete nervosa nec rigida nervosissima differt squamis exterioribus longe acuminatis interiores subaequantibus etc.

SCORZONERA PANICULATA Boiss. (Sect. *Lasiospora* DC.)

Sc. glabriuscula, caule *elato valde folioso superne longe thyrsoideo-paniculato*, foliis sessilibus, *lanceolatis rigidis acuminatis sub 5 nerviis*, nervis valde prominulis secus caulem decurrentibus margine subscabridis, superioribus ad ramorum basin lanceolato-linearibus breviter acuminatis, ramis squamulis linearibus auctis apice subincrassatis monocephalis, involucri glabri *squamis omnibus acuminatis, inferioribus triplo brevioribus intimis flores luteos subaequantibus, ovariis villosis, pappi rufescentis setis parte inferiori plumosis superiori scabris.*

Hab. in *Kurdistanâ* prope *Diarbekir* Kotschy in Mus. Imp. Vindob. No. 223.

Planta speciosa, cujus partem superiorem tantum vidi probabiliter 3-4 pedalis, folia plana fere tres pollices longa $\frac{1}{2}$ pollicem lata, panicula elongata strictiuscula pedalis, capitula illis *Sc. ensifoliae* paululum minora abs quâ foliis multo latioribus nec longissime attenuato-subulatis inflorescentiâque ramosissimâ differt. *Sc. nervosa* Trevir. brevi diagnosi meae speciei valde affinis, ab eâ differre videtur foliis ventricosolanceolatis multinerviis arachnoideis. *Sc. latifolia* quoque valde affinis differt indumento sericeo-tomentoso, foliis multinerviis margine crispulis, paniculâ depauperatâ etc.

SCORZONERA SUBAPHYLLA Boiss. loc. cit. Febr. 1845. (Sect. *Polyclada* DC.)

Sc. glaucescens, radice multicaulis collo lanuginoso, foliis breviter puberulis paucis radicalibus lineari-lanceolatis basi attenuatis rigidis acutiusculis, caulibus ramosissimis ramisque strictis erectis rigidis, foliis

caulinis ad dichotomias paucis linearibus brevibus, ramis squamulosis, post anthesin subspinescentibus, capitulis ad ramorum extremitatem solitariis parvis subcylindricis paucifloris, involucri pauciseriati glabriusculi squamis infimis minutis triangularibus, *caeteris oblongis acutiusculis flosculos luteos non aequantibus*, acheniis

Hab. in rupestribus *Persiae australis* in alpe *Kuh-Daëna* Kotschy No. 581.

Caulēs in dumos densos aggregati erecti stricti $\frac{1}{2}$ -1 pedales subaphylli. Folia inferiora *Bupleuri caricifolii*, rami inferne squamulosi, capitula magnitudinis eorum *Sc. ramosissimae* DC. cui affinis est et quae a nostrâ specie pedunculis gracilibus elongatis, involucri phyllis interioribus longe acuminatis egregie distinguitur.

SCORZONERA INTRICATA Boiss. (Sect. *Polyclada* DC.)

Sc. glabra vel adpresse puberula glaucescens multicaulis, *caulibus subaphyllis a basi ramosissimis tortuosis teretibus intricatis*, foliis radicalibus paucis cito obsoletis caulinisque ad dichotomias lineari-subulatis brevibus recurvis, superioribus ad squamulas reductis, capitulis ad apicem ramorum cylindricè incrassatorum parce squamulorum minutis paucifloris, involucri glabrescentis squamis lanceolatis acutis exterioribus brevibus, interioribus triplo longioribus acuminatis flores luteos subaequantibus, acheniis glabris, pappi rufescentis achenio longioris setis omnibus usque ad medium plumosis. superne scabris.

Hab. in *Persia* prope *Ispahan* Aucher No. 3565, 4866, 4889, 4890 et 4891.

Planta fere omnino nuda dumosa caulibus 2-6 pollices longis plus minusve tortuosis intricatissimis more *Sonchi spinosi*. Folia subulata recurva subteretia inferiora cito exsiccata, ramorum extremitas florifera erecta tota longitudine incrassata, quo caractere et habitu ab affinibus *Sc. ramosissima* et *subaphylla* facile distinguitur.

LACTUCA PERSICA Boiss. loc. cit. Febr. 1845. (Sect. *Cyanoseris* Koch.)

L. glabriuscula, radice caule elato simplici striato-angulato superne racemoso paniculato, *foliis omnibus indivisis oblongo-lanceolatis obsolete dentatis denticulatis inferioribus in petiolum attenuatis superioribus sessilibus utrinque subdecurrentibus*, ramis paniculae glan-