

HAB. Mt. Wellington, Gunn. :—v. v. n.

Nov. Gen. CENTROPAPPUS. Hook. fil. *Capitulum* heterogamum, multiflorum, radiatum; *fl. rad.* 1-serialis, fœmineis, ligulatis, ligula latissima, 9-nervi; styli ramis elongatis; *fl. disci* plurimis tubulosis, superne campanulatis, 5-fidis, lobis linear-i-elongatis revolutis; antheræ ecaudatæ; styli rami apice solum penicillati. *Receptaculum* planum, nudum, alveolatum. *Involucri* 1-serialis squamæ rigidæ, coriaceæ, ciliato-fimbriatæ, disco $\frac{1}{2}$ breviores, basi bracteolatæ. *Achæniūm* erostre, linear-i-oblongum, glaberrimum. *Pappi setæ* 1-serialis, flexuosæ, per totam longitudinem barbellatæ, setis cylindraceis acutis superne gradatim elongatis supremis calcariformibus.—Arbuscula Frutexve Tasmaniæ *alpestris*, *glaberrimus*. Rami transverse grosse cicatricati, teretes. Folia apices versus ramulorum, patentia, linearia, sub-obtusa, sessilia, integerrima, 1-nervia, facie Bupleuri. Capitula flava ad apices ramulorum corymbosa, pedicellata. Pappi setæ fere ut in Bedfordia.

50. Centropappus Brunonis.

HAB. Mt. Wellington, Gunn.

Frutex ramulosus, 7-9 pedalis. *Folia* 3 unc. longa, 3 lin. lata, subcoriacea. *Capitula* latiuscula, $\frac{1}{3}$ unc. longa, subviscosa. *Pappus* sordide albidus.

SCORZONERA. Subgen. MONIERMOS: *Pappus* uniserialis, paleis angustissime linearibus sursum sensim angustatis, scabris. — Herbæ *scapigeræ* Australasicæ, Novæ Zælandiæque, facie Hypochæridis.

51. Scorzonera (Moniermos) *Lawrencii*; radice fusiformi simplici v. divisa, foliis glaberrimis anguste linearibus linear-lanceolatisve gramineis integerrimis pinnatifidis marginibusve lobuliferis segmentis divaricatis recurvisve plerumque linearibus, involuci cylindracei squamis acuminatis, margine anguste membranaceis exterioribus ovatis intimis linear-lanceolatis.

HAB. Abundant.

Statura foliorumque longitudine et latitudine variabilis.