

§ 2. **Foliosæ.** — Caules plus minus foliosi sæpius elati. Herbæ glabræ vel pubescentes.

* Achenia ad costas transverse squamoso-muricata vel dentata.

S. semicana, nivalis, papposa, Libanotica, incisa, calyculata, lacera, Hispanica, crocifolia, stricta.

* * Achenia lævia vel ad costas superne obsolete tuberculata.

S. purpurea, elata, acuminata, Austriaca, humilis, parviflora, pusilla.

§ 3. **Tomentosæ.** — *Gelasia* Cass. — Caules erecti foliosi. Herbæ dense pannosæ vel canæ. Pappi setæ plumosæ vel scabré.

* Pappi setæ inferne saltem plumosæ.

S. argyrea, cinerea, Cilicica, Persica.

* * Pappi setæ a basi scabré.

S. tomentosa.

§ 4. **Pulvinares.** — *Gelasia* D.C. Prodr. ex parte. — Plantæ pumilæ dense pulvinares. Folia linearia. Caules scapi-formes subnudi. Pappi setæ plumosæ apice scabré.

S. pygmea, Mackmeliana, rigida, sericea, filifolia, Seidlitzii.

5. **Intricatæ.** — Suffrutes a basi ramosissimi ramis flexuosis intricatis. Pappi setæ plumosæ apice scabré.

S. intricata, tortuosissima.

SECT. III. LASIOSPORA Less. — Gen. *Lasiospora* Cass. — Achenia totâ longitudine villosissima vel lanata. — Plantæ perennes.

* Pappus scaber.

S. araneosa.

* * Pappus plumosus.

+ Radix in tuber incrassata.

S. lanata, tuberosa, psychrophila, gageoides.

+ + Radix cylindrica vel fusiformis.

S. eriophora, Ispahanica, veratrifolia, nervosa, Aucheriana, Cretica, ensifolia, eriosperma, Kotschyi, ramosissima, subaphylla.

SECT. IV. EPILASIA Bunge Pl. Lehm. p. 376. — Achenia parte inferiori glabra, ad medium vel infra apicem annulo calloso cincta ex quo oriuntur squamulæ in lanam densissi-