

S. J. LIPSCHITZ

FRAGMENTA MONOGRAPHIAE
GENERIS SCORZONERA

Имеклю. Полынная степь на третичных глинах 5.IV. 1915, n° 24. И. М. Крашенинников; 7) Г. Кран-тау 15. IV. 1915 И. М. Крашенинников; 8) Хива. В низине перед Усть-Уртом к югу от могилы Карли-бас (Бала-аулие) 21. IV. 1915 И. М. Крашенинников; 9) Склоны обрывов Усть-Урта бл. могилы Джунь [к западу от могилы Ак-мула] 24. IV. 1915 И. М. Крашенинников; 10) Шейх-Джеме 2. V. 1913, n° 1516 М. Г. Попов; 11) Горы Букаи тау 17—18. IV. 1913 Д. Букин; 12) Долина Кара-Чингиль-тау. 12. IV. 1914, n° 39. Н. И. Смирнов; 13) Пески к северу от Кипчака 18. IV. 1914 Н. И. Смирнов; 14) Верхняя часть Биш-тау 22. IV. 1914 Н. И. Смирнов; 15) Южный склон Султан-Уиз-Дага против креп. Кыл-кала 30. III. 1915, n° 3. И. М. Крашенинников; 16) Южн. склон Султан-Уиз-Дага у подошвы Казан-тау 3. IV. 1914 Н. И. Смирнов; 17) Султан-Уиз-Даг. 13. V. 1932. К. Муравлянский; 18) Каракалпакские Кызыл-кумы. Окр. кол. Ой-генек. 26. VII. 1932. К. Муравлянский; 19) Останцы у колодца Баскара в Каракалпакских Кызыл-кумах. 1. VI. 1932. К. Муравлянский.

Узбекистан и Туркмения: многочисленные образцы.

Всего просмотрено по всему ареалу вида *Scorzonera pusilla* Pall.—около 300 листов образцов.

6. SECT. PAPPOSA, SUBSECT. HISSARICA LIPSCH.

Subsect. Hissarica Lipsch., subsect. nova, hoc loco. Корень утолщен в клубень. Стебли стрелковидные, слабо облиственные. Корзинки цилиндрические или обратно-конические. Семянки крупные, голые, ребристые, по ребрам шероховатые. Летучка из жестких щетинок, щетинки у основания или целиком черновато-фиолетовые, по всей длине перистые. [1 вид].

От секции *Papposa* отличается жесткими черновато-фиолетово окрашенными щетинками летучки, от секции *Pseudopodosperrum* отсутствием ножки у основания семянки, формой листьев.

Radix in tubere dilatata. Caulis scapiformes vix foliiferi. Capitula cylindracea vel obconica. Achaenia magna glabra costata, costis muricatis. Pappi setae rigidae plumosae fuliginoso-violaceae.

[Incl. 1 species.]

A sect. *Papposa* setis rigidis fuliginoso-violaceis differt, a sect. *Pseudopodosperrum* achaeniis basi non suffultis, foliis late ovato-lanceolatis sat distat.

Примечание. Жесткость щетинок летучки семянки и их черновато-фиолетовая окраска выдержана на всех просмотренных мной образцах *Sc. hissarica*. Из остальных видов рода обладающих покрашенной летучкой семянки, относящихся к другим подразделениям рода, следует отметить: *Scorzonera colorata* Н. Krasch., *Scorzonera leptophylla* (DC) Н. Krasch. et Lipsch. (летучка серая), *Sc. Doriae* Deg. et Bald., *Scorzonera Koslovskiyi* D. Sosn. ex Lipsch., *Sc. pygmaea* Sibth. et Sm. и нек. друг. Все упомянутые виды по совокупности других морфологических признаков резко отстоят от *Sc. hissarica* Winkl.

1. *Scorzonera hissarica* C. Winkl. in Acta Horti Petropol. XI (1889) p. 172, n° 10; Lipschitz. De scorzoneris asiaticis notulae systematicae. Mosqua (1932) p. 13—15; [in Indice kewensi lapsu calami «*Scorzonera Hissarica*»].

Icon.: Lipsch. op. cit. (1932) p. 31, fig. 7; conf. tab. 9.

Многолетник, корень утолщен в клубень, часто 2—3—(5) головчатый. Корневая шейка одета бурыми, расширенными остатками прошлогодних влагалищ прикорневых листьев. Стебли в виде слабоблиственных стрелок (6)—10—20—(30) см длины, слабо опушенные, заканчивающиеся одиночными корзинками. Прикорневые листья широко-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, на верхушке заостренные, по краю слегка хрящеватые, волнисто-зазубренные, слегка изогнутые, покрытые снизу палестом, позднее стирающимся, оттянутые в черешок, в основании расширенным во влагалище. Стеблевые листья малочисленные, сидячие, ланцетные, более узкие чем прикорневые. Корзинки крупные, широко-цилиндрические или обратно-конические. Обертка из 8—12 листочков, опушенная или почти