

§. 2. **Foliosæ.** — Caules plus minus foliosi sæpius elati. Herbæ glabræ vel pubescentes.

\* Achenia ad costas transverse squamoso-muricata vel dentata.

*S. semicana, nivalis, papposa, Libanotica, incisa, calyculata, lacera, Hispanica, crocifolia, stricta.*

\* \* Achenia lævia vel ad costas superne obsolete tuberculata.

*S. purpurea, elata, acuminata, Austriaca, humilis, parviflora, pusilla.*

§ 3. **Tomentosæ.** — *Gelasia* Cass. — Caules erecti foliosi.

Herbæ dense pannosæ vel canæ. Pappi setæ plumosæ vel scabré.

\* Pappi setæ inferne saltem plumosæ.

*S. argyrea, cinerea, Cilicica, Persica.*

\* \* Pappi setæ a basi scabré.

*S. tomentosa.*

§ 4. **Pulvinares.** — *Gelasia* D.C. Prodr. ex parte. — Plantæ

pumilæ dense pulvinares. Folia linearia. Caules scapi-formes subnudi. Pappi setæ plumosæ apice scabré.

*S. pygmea, Mackmeliana, rigida, sericea, filifolia, Seidlitzii.*

5. **Intricatæ.** — Suffrutices a basi ramosissimi ramis flexuosis intricatis. Pappi setæ plumosæ apice scabré.

*S. intricata, tortuosissima.*

SECT. III. LASIOSPORA Less. — Gen. *Lasiospora* Cass. — Achenia

totâ longitudine villosissima vel lanata. — Plantæ perennes.

\* Pappus scaber.

*S. araneosa.*

\* \* Pappus plumosus.

+ Radix in tuber incrassata.

*S. lanata, tuberosa, psychrophila, gageoides.*

+ + Radix cylindrica vel fusiformis.

*S. eriophora, Ispahanica, veratrifolia, nervosa, Aucheriana, Cretica, ensifolia, eriosperma, Kotschy, ramosissima, subaphylla.*

SECT. IV. EPILASIA Bunge Pl. Lehm. p. 376. — Achenia parte inferiori glabra, ad medium vel infra apicem annulo calloso cincta ex quo oriuntur squamulæ in lanam densissi-