

- inæqualibus mucronatis sèpè dentatis. \mathcal{U} in Archipelagi Græci insulis Naxo ad montem Zia (Tourn. Oliv.!), Melo (d'Urv.), Syra (Auch.!), in Taygeto (Zucc.!). Scorzonera Græca, etc. Tourn. voy. 1, p. 223. Catananche Græca Linn. sp. 1142. Scorzonera elongata Willd. sp. 3, p. 1507. Hymenonema Tournefortii Cass. dict. 22, p. 316. Variat foliorum lobis linearibus et ovatis. (v. s.)
2. *H. ASPERUM*, foliis scabris radicalibus caulinisque inferioribus elongatis remotè pinnatifidis, lobis acuminatis integris. — in Oriente semina legit cl. Olivier. Scorzonera aspera Desf. ann. mus. h. n. par. 1, p. 133. t. 9. Pers. ench. 2, p. 362. Scorzonera stylosa Pers. ench. 2, p. 361. Hymenonema Fontanesii Cass. dict. 22, p. 317.

DCCCXIII. SCORZONERA DC. fl. fr. ed. 3, p. 59. Less. syn. 134. — Scorzonera Gelasia et Lasiospora Cass. — Scorzonera et Lasiospermum Fisch. — Scorzonerae sp. Linn. Gærtn.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. nudum. Achænum estipitatum erostre (aut rariùs rostratum), areolâ laterali. Pappus pluriserialis conformis plumosus aut rariùs scaber. — Herbæ. Radix fusiformis aut tuberosa. Folia sèpiùs integerrima, rariùs dentata aut pinnatifida. Caulis simplex 1-cephalus aut ramosus, ramis 1-cephalis. Flores nunc purpurei, sèpiùs flavi, ligulis subtùs concoloribus aut purpurascensibus.

Sect. I. EUSCORZONERA. — Scorzonera Cass. dict. 25, p. 63 et 264.
— Scorzonerae sect. 1^a Less. l. c.

Achænia glabra. Pappus plumbosus, paleis interiorum quinis apice nudis longioribusque. Capitula multiflora.

* *Floribus purpureis, foliis integris aut subdentatis rarissimè lobatis.*

3. *S. ALBICAULIS* (Bunge enum. pl. chin. n. 230), radice tuberosâ oblongâ, caule folioso 2-6-cephalo pedunculisque albo-tomentosis, foliis linearibus elongatis basi floccosis demùm glabratris nervosis, omnibus planis, invol. squamis lanceolatis acutis, exter. basi pubescensibus, achæniis glabris. \mathcal{U} ad radices montium Chinæ septentrionalium. Flores pallidè rosei. Invol. cylindraceum. (v. s. comm. ab hon. acad. sc. petrop.)
2. *S. SZOWITZII*, glabra, radice tuberosâ globosâ, tubere supernè in truncum cylindraceum longè prodneto, foliis lato-linearibus glaucescentibus caule longioribus, caule 1-cephalo, invol. cylindrici squamis margine subscariosis, infer. brevioribus. \mathcal{U} in collibus siccis ad Schabanli distr. Khoi prov. Aderbeischan Persiae legit cl. Szowitz. S. mollis Fisch. et Mey.! pl. Szow. ined. Cor. purpureæ. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
3. *S. UNDULATA* (Vahl symb. 2, p. 86), radice cylindricâ crassâ, caule erecto simplici subscapiformi aut ramoso, ramis apice subtomentosis 1-cephalis, foliis lanceolatis apice subulatis undulatis tomentosis aut glabratris, invol. cylindrici squamis acuminatis, exter. dorso tomentosis laxiusculis, inter. glabris. \mathcal{U} in Barbariae arenosis (Desf.), Græciae saxosis (Tourn.), inter lapides ad montem Sinaï (Schimp.! n. 129) et in Ciliciâ (Auch.!). Desf. fl. atl. 2, p. 219. Lam. ill. t. 647. f. 2. mala, Capit. magnit. S. Hispanicæ. Cor. violaceæ. (v. s.)
4. *S. ARANEOSEA* (Sibth. fl. græc. t. 785. ex prod. 2, p. 183), radice tuberosâ globosâ, caule 1-cephalo foliis breviore pulverulento tomentoso, foliis linearibus recurvis villosis seu glabriuscis, invol. squamis dorso pulv. hirsutis, exter. acuminatis apice recurvis. \mathcal{U} in insulâ Cypro (Sibth.). Affinis S. tuberosæ sed capitula triplo majora, etc. Flores purpurei. (v. s. sine loci design. à cl. Olivier in Oriente lect.)