

C L A S S I S XIX.

SYNGENESIA-AEQUALIS.

ARNOPOGON PICRIOIDES, *b. litorale.*

A. caule foliisque oblongis sinuato-dentatis hispidiusculis, pedunculis aequalibus, calycibus glabris.

Ic. *nulla.*

In maritimis sepibus Calabriae; *Reggio, Melito, Brancaleone.*

Martio, Aprili. ☉

SCORZONERA TRACHYSPERMA. *Günth. ?*

S. caule glabro simplici vel basi ramoso, ramis erectis unifloris, foliis integerrimis radicalibus lanceolatis, caulinis linearibus canaliculatis, squamis calycinis glabris acutis, exterioribus duplo brevioribus, seminibus aspero-tuberculatis, pappi setulis interioribus a medio ad apicem simplicibus, basi arachnoideo-plumosis. *Günth. ex Spr. s. veg. 3. p. 666.*

Ic. *nostra t. 53.*

b. pubescens; caule foliisque basi arachnoideo-pubescentibus.

c. undulata; caule inferne arachnoideo-pubescente, foliis margine undulatissimis, basi crispis.

In collibus, et campis herbidis maritimis Cala-

briac orientalis; *Capo Brazzano, Capo Colonna, Cotrone*; var. *c.*, *Cassano, Europoli, Amendolara.*

Aprili, Majo. 4

Folia tenue nervosa; radicalia lanceolata, acutiuscula, 1 $\frac{1}{2}$ - 2 poll. longa, 3-4 lin. lata, rosulata, patentia, in petiolum attenuata, ad margines plana vel crispato-undulata; caulina linearia, margine plana, vix lin. lata, 3-4 poll. longa, basi amplexicaulia. *Pedunculi* elongati, glaberrimi, leves. *Calycis* squamae glaberrimae, margine submembranaceae; exteriores ovato-lanceolatae, apice attenuatae, concavae, subcarinatae, aliquando apice recurvae, 2-5 lin. longae; interiores 9-10 lin. longae, acutae, sed non attenuatae, ad margines sub apice saepius ciliatae. *Semina* striata, ad angulos squamulis muricata, glaberrima, alba, 5-6 longa. *Pappus* candidus, sessilis, calycem vix excedens. *Flores* lutei.

S. serrulata, *Viv. fl. lyb. spec. p. 48. t. 17. f. 4.* differre videtur ab hac; foliorum habitu, florum colore purpureo non luteo, seminibus brevissimis, quae in nostra sunt elongata; tamen Cl. *Spr. l. c.* nequidem uti varietates habet.

SCORZONERA HIRSA. *Lin.*

S. caule basi subramoso adscendente unifloro foliisque linearibus carinatis hirsuto, seminibus lanatis (albidis, pappo rufo). *Lin. mant. 278. Will. sp. pl. 3. p. 1503*, excluso synonymo *Tournefortii. Pers.*