

dans les cultures irriguées du Liban. Nous l'avons observée notamment à Aïn Zehalta et à Hammana. A remarquer que le qualificatif *minuta* ne convient guère à une plante qui peut atteindre 6-8 dcm. Linné l'a tiré d'une transposition incomplète de la phrase de Dillenius : *Tagetes minuto flore*, et eût dû l'appeler *minutiflora*. Le nom de Schrank est également critiquable, car la plupart des *Tagetes* ont des feuilles glandulifères.

Cirsium Louisii Thiébaud, sp. nov.

Perennis, radice fibris fasciculatis incrassatis; caule elato (8-15 decim.) profunde sulcato apice ramoso; foliis vix sinuatis, spinulescentibus, utrinque tomentosus, tomento tenui floccoso caduce, radicalibus oblongo-lanceolatis 5-6 decim. longis, caulinis semi-amplexicaulibus paulo decurrentibus, ramealibus parvis non vel vix decurrentibus; pedunculis bracteolatis, haud alatis nec spinosis quam capitulum solitarium globosum basi truncatum vel subumbilicatum multo longioribus; involucreo subaraneoso 2-3 centim. largo, squamis lanceolatis, externis apice in acumen breve vix spinescens attenuatis, internis apice scariosis; floribus purpureis involucreo sesquolongioribus; achenia... (ignoti).

Juillet-août; marais de l'Amouk au N. du lac d'Antioche (Thiéb. et Frère Louis).

Scorzonera tuberculata Thiébaud, sp. nov.

Herba perennis, 4-6 decim. alta, radice fusiformi crasso squamato nigrescente; caule tenui erecto usque ad 2/3 folioso; foliis parce pubescentibus, lanceolato-linearibus, subgramineis, radicalibus et caulinis inferioribus 12-20 centim. longis, 4-7 millim. latis, in petiolum breve attenuatis, apice acuminatis; caulinis mediis et superioribus brevioribus semi-amplexicaulibus; capitulo solitario, involucreo laeviter pubescente, squamis inæqualibus, externis ovato-triangularibus, intimis oblongis, omnibus apice obtusis. Flores... Acheniis maturitate rufo-bruneis, glabris, 10-13 millim. longis, 10-costatis tuberculis conico-obtusis valde echinatis; pappi setis albedo-rufis inæqualibus, longioribus achenium æquantibus et apice denticulatis.

Juin (fruits); forêt du Bassit à la base du Cassius, vers Aïn Aramié.

Scorzonera elata Boiss. — Même localité que la précédente. Plante d'Asie mineure non encore signalée en Syrie.

Crepis Reuteriana Boiss. Diagn. Sér. I, 11, p. 55 et sa var. *alpina* Boiss. Fl. orientalis, 3, p. 55. — Boissier a réuni sous ce nom (espèce et variété) deux plantes qui certainement sont spécifiquement distinctes. Tandis que la première, considérée comme type, présente un système souterrain constitué par un rhizome très court densément fibrifère (radice brevis-sima præmorsa Boiss.) donnant naissance à une seule tige, la seconde, considérée comme variété, présente un rhizome allongé, rameux, écaillé, donnant naissance à de nombreuses tiges. A cette différence, non signalée par Boissier et déjà suffisamment décisive, s'ajoutent celles concernant le port, l'indument, la forme des feuilles, de sorte qu'il ne leur reste en commun que des caractères également applicables à d'autres espèces du genre.