

## 9. *Scorzonera Turkeviczi* H. Krasch. et. Lipsch. sp. nova.

Icon.: conf. tab. nostr. № 30, 31.

Слегка опушенный или почти голый многолетник с корнем, утолщенным в овальный (?) или веретеновидный клубень. Корневая шейка более или менее одета влагалищами прошлогодних листьев и чешуями. Стебли в количестве 1—3, в виде стрелок, (4) 6,5—12 см высоты, прямые или слегка изогнутые, опушенные, в нижней части или до половины олиственные. Листья яркозеленые, твердые, слегка опушенные или голые, неясно многонервные (7—9) (средний нерв выдающийся, белый), по краю хрящевидно-окаймленные, ± явственно волнисто-курчавые. Прикорневые ± широко-ланцетные, (4) 6—12 (16) мм ширины, плоские или вдоль сложенные, слегка изогнутые, на верхушке с притупленным мозолевидным острием, нередко спирально-закрученным, в основании переходящие во влагалища, окружающие корневую шейку. Стеблевые листья в нижней части стрелковидного стебля малочисленные, б. ч. узко-ланцетные (4—6 мм ширины), встречаются и широко-ланцетные (10—15 мм ширины), сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинки широко-цилиндрические (10—12 мм ширины<sup>1</sup>). Обертка опушенная из малочисленных, по краю перепончатых листочков; наружные листочки ее яйцевидные, туповатые; внутренние — продолговато-овальные, туповатые. Язычковые цветы в живом виде желтые (?), в сухом бледнорозовые с темными жилками. Семянки неизвестны.

От *Scorzonera mollis* MB. отлична более широкими, ланцетными листьями, яркозеленой окраской их, отсутствием ярко выраженного олиственного стебля, формой и величиной корзинок.

От *Scorzonera suberosa* C. Koch отличается шириной и формой листьев, окраской цветов. От *Scorzonera Alexandrina* Boiss. — обликом, шириной листьев, туповатыми, а не заостренными листочками обертки, ареалом.

*Perennis vix pubescens vel glabra radice in tubere ovali (?) vel fusiformi dilatata, collo vaginis foliorum vetustorum atque squamis membranaceis tecto. Caules 1—3, scapiformes (4) 6,5—12 cm alti, erecti vel subflexuosi, pubescentes, infra vel usque ad medio foliiferi. Folia laete viridia, rigida, vix pubescentia vel glabra, nervo medio albo valde prominente (7—9 nervis lateralibus inconspicuis), ad margines cartilaginea, ± crispato-undulata. Folia radicalia ± late-lanceolata, (4) 6—12 (16) mm lata, plana vel conduplicata, vix curvata, apice acuminata (acumine minimo calloso, saepe cochleato) basi in vaginas dilatata. Folia caulina pauca, anguste lanceolata (4—6 mm lata), interdum late lanceolata (10—15 mm lata), sessilia, subamplexicaulia. Capitula late cylindracea, 10—12 mm lata. Involucrum pubescens, involucri phylla pauca ad margines membranacea apice obtusata, exteriora ovata, interiora oblongo-ovalia. Flosculi in vivo videtur flavi, in sicco pallide rosei nerviis atropurpureis. Achenia ignota.*

*A Scorzonera mollis* MB. s. str. cui affinis foliis latioribus, lanceolatis, laete viridibus, caulibus scapiformibus atque capitulorum forma et dimensione differt.

*A Scorzonera suberosa* C. Koch foliorum latitudine et forma atque flosculorum colore differt. *A Scorzonera Alexandrina* Boiss. habitu, foliorum latitudine, involucri phyllis obtusatis non acuminatis atque area sat distat.

Typ. spec.: Prov. Kars. Kagisman. In decliviis argillosis, 30/IV 1914, № 65, S. Turkevicz. Species in memoriam S. I. Turkevicz nominata.

Изученные экземпляры. 1) Кагызманский округ, Нарапурт, глинисто-каменистый склон к Араксу, 8/V 1914, № 160, С. Туркевич; 2) Сурмалинский у., близ с. Казикопаран, каменные склоны, 10/VI 1913, № 12681, Ю. Воронов.

### \*. *Var. kubanica* H. Krasch. et Lipsch. var. nova.

Растение войлочно-опушенное, местами паутинистое. Известковые склоны. *Planta tomentosa interdum arachnoidea. In decliviis calcareis. Habit. in prov. Kuban.*

*Spec. examinata:* 1) Mons Schizé in decliviis calcareis meridionalibus. Prov. Kuban, 21/IV 1907, N. Busch et B. Klopotov; 2) Prov. Kuban in trajectu Venjaminskoi, 25/IV 1907, N. Busch et B. Klopotov.

<sup>1</sup> Измерение посредине корзинки.