

$\beta?$ *lanceolata*, foliis lanceolato-ovatis acutis. \mathcal{L} *S. tomentosa* Willd. sp. 3. p. 1498. Pappus dicitur capillaris scaber, et ideo (si descr. exacta) à generi fortè aliena.

$\gamma?$ *linearis*, foliis linear-lanceolatis apice subcallosis obtusis velutino-tomentosis. \mathcal{L} in Oriente. Radix lignosa apice multiceps. Folia 1 $\frac{1}{2}$ poll. longa, 2 lin. lata. Capitula lateralia pedicello suo longiora. Invol. squamis paucis, ext. dimidiò brevioribus. Pappus more Scorzoneræ plumosus. (v. s.)

38. *S. SERICEA* (Auch.! pl. exs. n. 3307), acaulis pluriceps, foliis radicalibus linearibus integerrimis strictis apice subcallosis utrinque adpresso sericeis, scapis folio vix longioribus sericeo-villosis 1-cephalis, invol. squamis glabris linearibus acuminatis. \mathcal{L} in excelsioribus montibus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Herba 3-pollic. Habitus ferè Gelasiae, sed pappi setæ basi plumosæ. Achænia glabra. (v. s. comm. à cl. inv.)

39. *S. VELUTINA*, tota tomento velutino cana, radice cylindraceâ, foliis radicalibus lanceolatis linearibus integerrimis acutis, caulis folio brevioribus simplicibus 1-cephalis basi folia 1-2 gerentibus, invol. squamis vix acutis erectis dorso lanato-canis. \mathcal{L} in Syria legit cl. Aucher pl. exs. n. 3312! An adhuc *S. tomentosæ* var.? Pappus rufidulus basi plumosus. Cor. flavæ. Folia 2-3 poll. longa. Capitula duplò majora quam in *S. tomentosæ* var. γ . (v. s. comm. à cl. inv.)

40. *S. FISTULOSA* (Brot. fl. Ias. 1. p. 329), glabra, caule adscendente articulato fistuloso, foliis fistulosis cylindraceis apice subulatis, pedunculis apice subvillosis, invol. squamis subcarinatis. \mathcal{L} in humidis et graminosis Lusitaniae prov. Beira. Cor. stramineo-luteæ. Radix fibrosa repens. Achæn. et papp. indescr.

b. *Foliis pinnatifidis.*

41. *S. CORONOPIFOLIA* (Desf. fl. atl. 2. p. 220. t. 44), pubescenti-subtomentosa, caule erecto subsimplici 1-cephalo basifolioso, foliis lanceolatis, aliis indivisis, plerisque rachi latâ pinnatifidis, lobis linearibus inæqualibus, invol. squamis mucronatis, exter. ovatis. \mathcal{L} in montibus Tunetanis (Vahl!) et Algeriensibus (Desf.). *S. brevicaulis* Vahl symb. 2. p. 88. t. 44. *S. laciniata* Vahl! herb. Folia ferè Podospermi, sed invol. et fructus (immaturus equidem) Scorzoneræ. Cor. flavæ ad faucem barbatæ. (v. s. specim. à Vahl ad L'Hér. miss.)

42. *S. CALVESCENS*, foliis ad collum confertis rigidulis pinnatipartitis, lobis rachi que linearibus subcanaliculatis, junioribus tomentosis, adultis glabris, scapo 1-cephalo tomentoso foliis breviore, invol. squamis ovato-oblongis acutis, exterioribus tomentosis, inter. glabris. \mathcal{L} in insulâ Seio leger. cl. Olivier et Bruguere. Herba vix 3-pollicaris. Flores lutei. Fol. lobi 3-4-jugi, lobo terminali cæteris triplò longiore incurvo. (v. s.)

Sect. II. GELASIA. — *Gelasia* Cass. bull. phil. mart. 1818. dict. sc. nat. 18. p. 285. 42. p. 81. — *Galasia* Less. syn. 134.

Pappus inæqualis, setis ad medium usque plus minus scabris nec verè plumosis. Achænia glabra.

43. *S. PYGMÆA* (Sibth. fl. græc. t. 783. ined. ex Smith. prod. 2. p. 122), acaulis, scapo subnudo 1-cephalo longitudine foliorum aut paulò longiore, foliis linearibus acuminatis canaliculatis suprà sublanatis, invol. squamis acuminatis extùs pubescentibus \mathcal{L} in Olympi Bithyniei cacumine (Sibth. Auch.!). Herba vix 3-pollicaris. Radix longa sublignosa ad collum multiceps. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. Aucher sub n. 3308.)

44. *S. RIGIDA* (Auch.! pl. exs. n. 3309), acaulis, foliis radicalibus linearibus integerrimis rigidulis utrinque tomento adpresso canis, scapis folia quadruplò superantibus nudis 1-cephalis, invol. squamis dorso subincanis lineari-lanceolatis acuminatis margine subseariosis. \mathcal{L} in montibus excelsioribus Cappadociae ad Euphratem legit cl. Aucher! Folia 2-poll. longa, lineam lata. Cor. flavæ. Pappus scaber. (v. s. comm. à cl. inv.)