

Folia digito vix latiora video; oris, ad lentem, tenuiter ferrulatis. Rami longi, flavo flore terminati.

952. SCORZONERA *Villosa*. Tab. 46.

DIAGN. *Tota villosa est. Caulis ramosus, striatus. Folia carinata, integerrima. Semiflosculi flavi; extimis subtus rubellis.*

Habitat in *Tergestina Ditione*.

Planta pedalis erecta. Folia falcata, semiamplexicaulia. Rami foliosi. Calycinae squamae (15), tomentosulae, dorso rubellae; oris flavescens. Diameter floris uncialis. Pappus rufus, obscure plumosus.

312. PICRIS.

LINN. *Gen. Plant.* 812.

CRENANIUM. ADANS.

Calyx, ad basin, auctus squamulis nonnullis patulis et permanentibus. Semen pappo plumoso, sessili coronatum.

953. PICRIS *Hieracioides*.

Picris perianthiis laxis; foliis integris. LINN *Syst. Nat.* p. 519. *Spec. Plant.* p. 792. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 686.

Picris aspera, foliis oblongis, dentatis, superioribus amplexicaulibus. HALL. *Hist.* n. 24.

DIAGN. *Caulis praecipue adspersus villis rigidis, bifidis; segmentis uncinatis. Semen flavescens, pappo proprio duplo brevius.*

Habitat in pratis et agris.

Folia video lanceolata, scabra, sessilia, amplexicaulia, obiter dentata. Squamae calycinae dorsum elevatum.

313. CREPIS.

LINN. *Gen. Plant.* 819.

Calyx ad basin auctus squamulis minoribus et duplo paucioribus, quam maiores aliae et  
*Scopoli Flora Carn. T. II.* G ere-

Tab. 46.



952. *Scorzonera Villosa.*

949. *Scorzonera Purpurea.*