

oblongis acutis nervis sublongitudinali, notatis, invol. squamis acutis tomentoso-canescensibus. ♀ in montosis herbidis Persiae valle Kadschadara prov. Nakistchiwan et in montibus Seidschadschi prov. Aderbeischan legit cl. Szowitz! Lasiospora latifolia Fisch. et Mey. ind sem. h. petr. 1835. p. 30. Affinis S. ensifoliae, sed folia latiora brevius acuminata, pubescentia tomentosa subsericea nec villis longis instructa. (v. s.)

53. S. ERIOPHORA, tota sericeo-lanata, caule 1-cephalo ad apicem usque patens hirsutissimo, foliis non longiore, foliis plerisque radicalibus linearilanceolatis 5-nerviis, invol. squamis linearibus acuminatis ligulas adæquantibus. ♀ in Cappadociâ ad Euphratēm detexit cl. Aucher pl. exs. n. 3317! Affinis S. lanatae. Lanugo ferè Hieracii eriophori. Flores flavi. Achaenia lanato-villosa. Herba 4-pollic. (v. s. comm. à cl. inv.)

54. S. AUCHERIANA, caule erecto ramoso striato, foliis linearilanceolatis acuminatis trinerviis margine lœvibus integerrimis parcè subvelutinis, adultis glabris, capitulis longè pedicellatis, invol. squamis lignas subæquantibus dorso subcanescensibus. ♀ in Cappadociâ ad Euphratēm legit cl. Aucher! S. divaricata Auch. pl. exs. n. 3315 non Turcz. Affinis S. latifolia sed glabrior, folia 3- nec 7-9-nervia, capitula dimidiò ferè minora. (v. s. comm. à cl. inv.)

55. S. NERVOSA (Trevir. ex linnaeâ 1835. litt. p. 73), caulis erectis simplicibus polycephalis, foliis ventricoso-lanceolatis margine scabris multinerviis arachnoideis, achaenii lanatis. ♀ in Armeniâ. Cæt. ign. †.

#### Sect. IV. PENTACHLAMYS.

Invol. squamæ 5 uniseriales. Achaenia glabra. Pappi setæ paucæ basi plumosæ apice aristæformes. — Species Indicæ. An genus proprium?

56. S. BUPLEUROIDES (Don prod. fl. nep. 162), caule erecto 1-cephalo glabro, foliis linearilanceolatis acutis planis glabris basi villosis caule brevioribus, invol. 5-phyllo, pappo inæquali scabro. (I) in Nepaliæ montibus legit cl. Wallich. Radix fusiformis. Flores striati involucro breviores. An ex invol. 5-phyllo et pappo scabro vera Scorzonera species?

57. S. ROYLEI, caulis è basi ramosis erectis glabris, ramis apice nudis, 1-cephalî, foliis lanceolato-linearibus basi dilatata subvaginantibus margine villosis apice callosis glabris, invol. 5-phyllo, pappi setis basi plumosis apice nudis. — in Indiâ orient. legit cl. Royle. Species ab omnibus Europæis distinctissima. Affinis S. bupleuroidei videtur sed flores invol. per anthesin breviores demum longiores, pappus verè plumosus et folia basi vaginantia (ferè ut in Alopecuro) et pallida satis distinguunt, saltem ex descr. Donianâ. (v. s. comm. à cl. Royle.)

#### Sect. V. POLYCLADA.

Capitula 6-8-flora. Invol. squamæ 6-8 pluriseriales. — Caules ramosissimi foliosi. Cor. flavæ.

58. S. DIVARICATA (Turcz. dec. p. 21. n. 23), glabra, radice suffrutescente, canalis ramosissimis divaricatis, foliis brevibus filiformibus apice uncinato-recurvatis, capitulo paucifloro, invol. cylindrici cano-pubescentis squamis inter. 3-5, infer. totidem abbreviatis. ♀ in montosis lapidosis Mongoliae Chinensis. Flores pauci lutescentes subtils purpurascentes. Achaenia glabra. Pappus basi plumosus. (v. s. comm. à cl. auct.)

59. S. RAMOSISSIMA, caule erecto ramosissimo, foliis linearibus glabris acuminatis, capitulis longè pedicellatis nudis circ. 6-7-floris, invol. squamis acuminatis lignas æquantibus. ♀ in Oriente ad Elwend legit cl. Aucher! S. eriosperma Auch. pl. exs. n. 3330, sed differt ab eâ et ab omnibus ferè aliis capitulis 6-7- nec multifloris. Folia caulinâ circ. pollicem longa, 1-2 lin. lata, Cor. flavæ. (v. s. comm. à cl. inv.)

60. S. VIRGATA, infernè sublanata, cæterum glabra, caule ramosissimo, ramis virgatis, foliis sub origine ramorum linearibus elongatis acutis, capitulis paucifloris, invol. 6-7-phyllo glabro. ♀ in Indiâ hor. occid. legit cl. Royle! Affinis S. divaricatae, sed folia longiora apice non uncinata. (v. s. comm. à cl. inv.)