

abgehend; Haare vollkommen linienförmig. Fruchtboden ohne Spreublätter.

a. Achenien ungeschnäbelt, am Ende abgestuft.

*Sonchus*. (217.) Früchte gleichförmig, etwas zusammengedrückt, streifig und in die Quere runzelig. — *S. oleraceus*, jährlich, Blätter lanzettförmig, schrootzählig, stängelumfassend, wie der Stängel und die Hüllblätter glatt. Gemein.

b. Achenien geschnäbelt.

*Crepis*. (222.) Köpfe vielblumig; Achenium drehrund, allmählig geschnäbelt; Samenkronen in mehreren Reihen. — *Cr. tectorum*, Blumenstiele gegen das Ende verdickt, Hüllblätter haarig und drüsig; Achenien so lang als die Samenkronen. Gemein.

*Taraxacum*. (219.) Köpfe vielblumig, äußere Hüllblätter zurückgebogen. Achenien am Grunde des Schnabels mit vielen Zähnen, Samenkronen in mehreren Reihen. — *T. Dens leonis* (Löwenzahn), Schaft mit 1 Bl. Kopf, hohl, Wurzelblätter länglich, linienförmig, schrootzählig.

*Lactuca*. (217.) Köpfe wenigblumig; Hüllblätter schuppenförmig; Achenien zusammengedrückt, gestreift, mit nicht sehr langem Schnabel und Samenkronenhaaren in mehreren Reihen. — *L. Scariola*, Blätter schrootzählig, fiederspaltig, am Grunde pfeilsförmig, Kiel stachelig. Auf trockenem Boden.

*Prenanthes muralis* (218.) vereinigt Lessing mit *Lactuca*, da sie bloß durch die in 2 Reihen stehenden Hüllblätter abweicht; Blüthenköpfe 5blumig, Blätter leierförmig, schrootzählig, stängelumfassend. Gemein.

*Chondrilla*. (217.) Köpfe wenigblumig, Hülle zylindrisch, Blätter in einfacher Reihe. Achenien rund, langgeschnäbelt. — *Ch. juncea*, Blüthenköpfe 10blumig; Blätter länglich, die Wurzelblätter ungleich gezähnt, sitzend, nicht umfassend, glatt; Stängel unten rauh.

3. *Scorzonereae*. Samenkronen besteht aus halblanzettlichen, feinen, gefiederten, rauhen Spreublättern; Fruchtboden ohne Spreublätter. Blumen gelb oder rötlich.

*Picris*. (216.) Achenium rund, in die Quere runzelig, nach oben bloß verengt; Samenkronenhaare in 2 Reihen, gefiedert, die äußere fast einfach; Hülle schuppig, rauh. — *P. hieracioides*, Stängel aufrecht, rauh; Blätter stängelumfassend, lanzettlich, gezähnt; Blüthenköpfe in Schirmen; äußere Hüllblätter schlaff.

*Scorzonera*. (215.) Achenien uneben, warzig, gestreift, ungeschnäbelt; Samenkronen in vielen Reihen, Haare rauh oder gefiedert. Hüllblätter schuppig, in mehreren Reihen. — *Sc. humilis*, Stängel nackt, einfach; Blätter lanzettförmig, eben; Hüllblätter wollig. In Gebüsch.

*Tragopogon*. (214.) Achenium geschnäbelt, gestreift; Samenkronen