

disci crebris, achæniis glabris regulariter striato-sulcatis. — in Peruvia legit cl. Hænke. Herba sesquipedalis apice viscosa. Folia 3 poll. longa, 7-10 lin. lata. Recept. omnino nudum. Pappus albissimus mollis. Invol. squamæ 6-7 lin. longæ. (v. s. in h. Hænke à cl. de Sternberg miss.)

\* \* \* \* \* Radiati, scapiformes. H. B. Kunth nov. gen. am. 4. p. 173.

508. S. PEDICULARIFOLIUS (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 173), herbaceus glaber, caule scapiformi 1-cephalo densè bracteato folia vix superante, foliis radicalibus petiolatis profundè pinnatipartitis, lobis creberrimis oppositis sub-rhombeis hinc dentato-angulatis approximato-imbricatis, invol. hemisphærico-campanulato polyphyllo calyculato, ligulis circ. 20, fl. disci crebris, achænio glabro. ♀ in prov. Quitensi ad radices montis Tuneragua alt. 1500 hex. Folia 1½-2 poll. longa, petiolo semipollie.

509. S. NUBIGENUS (H. B. et Kunth l. c. p. 174), herbaceus glabriusculus, caule scapiformi 1-cephalo densè bracteato duplò superante, foliis radicalibus longè petiolatis profundè pinnatipartitis, lobis 15-17 alternis approximatis grossè crenato-lobatis, invol. campanulato circ. 20-phyllo crebrè calyculato, ligulis circ. 20, fl. disci 110-120, achæniis seabriusculis. ♀ in Andibus Assuayensibus inter montem Silzan Quitenium et Alto de Pilches alt. 1800 hex. Folia 1-1½ poll. longa, petiolo 1-2-pollic., lobis 4-5 lin. longis.

510. S. PIMPINELLÆFOLIUS (H. B. et Kunth l. c. p. 174. t. 364), herbaceus glaber, caule scapiformi 1-cephalo bracteato longissimo, foliis radicalibus longissimè petiolatis profundè pinnatipartitis, lobis 15-17 alternis approximatis grossè crenato-lobatis, invol. campanulato circ. 20-phyllo calyculato, ligulis circ. 22, fl. disci crebris. ♀ in Amer. mer. propè Hambato, Pelileo et Quito alt. 1300-1500 hex. Dorobæa pimpinellæfolia Cass. dict. 48. p. 453. Folia circ. 5-pollic. longa sesquipollie. lata, petiolo semipollici.

511. S. LACINIATUS (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 175 non Bertol.), herbaceus glaber, caule scapiformi bracteato 1-cephalo longissimo, foliis radicalibus petiolatis profundè pinnatipartitis, lobis 15-17 suboppositis hinc argutè serrato-incisis distantibus, invol. campanulato 20-phyllo calyculato, ligulis 22-24, fl. disci crebris. ♀ in collibus siccis juxta Loxa et Gonzanama Quienstium alt. 1060 hex. Fol. rad. 4-pollicaria, 1½ poll. lata, petiolo 3-6-pollic.

## Ser. XV. MEXICANI (Californicus et australi-Ludovicianis inclusis.)

\* Discoidei.

512. S. ARONICOIDES, caule herbaceo erecto simplici araneoso-hirsuto, foliis infer. in petiolum basi semiamplexicaulem longè attenuatis ovatis inæqualiter dentatis suprà glabris subtùs araneosis, super. sessilibus oblongis acutis basi aurito-semamplexicaulibus subadnatis grossè dentatis utrinque araneosis, corymbo terminali congesto, invol. calyculati squamis circ. 10 acuminatis araneosis, ligulis nullis, fl. 10-12 tubulosis, achænio glabro. ♀ in California legit cl. Douglas. Herba 8-10 pollic. Fol. infer. petiolo inclusu 5 poll. longa. (v. s.)

\* \* Radiati, annui, foliis ferè omnium pinnatisectis.

513. S. CALIFORNICUS, herbaceus glaber erectus subsimplex, caule subangulato apice corymboso, foliis radic. oblongis basi in petiolum attenuatis integris, canlinis auritis semiamplexicaulibus lanceolatis dentatis, corymbo simplici subconferto, invol. campanulato parcè calyculato squamis 20 acuminatis, ligulis circ. 20 plurinerviis, fl. disci circ. 60, achæniis villoso-velutinis. (I) in California legit cl. Douglas. (v. s.)

f. laxior, corymbo laxiore, ligulis 10-15, fl. disci circ. 50, achæniis densius villosis. (I) in California etiam legit cl. Douglas. (v. s.)

514. S. FLOCCIFERUS, caulinis herbaceis angulatis glabris à basi ramosissimis,

foliis plerisque radicalibus pinnatipartitis, lobis ovatis auctè dentatis ad axillas hinc indè pilos floccosos densè aggregatos gerentibus, foliis caulinis paucis sub orig. ramorum, capitulis ad apices ramulorum solitariis, inv. glabris calyculatis, ligulis subnulis difformibus fœmineis vix à disco distinetis. (I) in California legit cl. Douglas. Species distinctissima, sed ex capit. junioribus analysis subdubia. Achænia glabra. Pappus albissimus cor. disci paulò brevior. (v. s. comm. ab hon. Soc. hortic. Londin.)

515. S. MISSISSIPPIANUS, herbaceus glaber, caule erecto striato-angulato, foliis pinnatisectis, infer. petiolatis exstipulatis, sup. basi parvè auriculatis, segmentis 3-4-jugis remotis ovatis dentatis, terminali in fol. radie. majore reniformi, corymbo composito fastigiato polycephalo, pedicellis parcè et brevè bracteolatis, invol. squamis 15-18, ligulis 10, fl. disci circ. 40, achæniis subpubescentibus. (I) in uliginosis ad ripas flum. Mississipi inter Novam-Aureliam et fortal. la Balize maio flor. legit cl. Berlandier pl. exs. 1946! Folia crassinscula formis segm. inter se varia. Corymbus nunc confertus, nunc laxus. Flor. exteriores disci hinc indè ut in Erigerontibus Trimorphæis fœminei. (v. s.)

516. S. TAMPICANUS, herbaceus glaber, caule erecto tereti ramoso, foliis pinnatisectis, infer. . . . . super. basi in auriculam amplam lacero-multifidam utrinque dilatatis, segmentis 4-5-jugis oppositis oblongis irregulariter sinuato-dentatis, ultimis subconfluentibus, corymbis ramos terminantibus compositis laxis, pedicellis vix bracteolatis, invol. 20-phyllo demùm reflexo, ligulis 10, fl. disci circ. 50, achæniis glabriusculis. (I) in Mexico orient. ad Tampico de Tamaulipas legit cl. Berlandier, pl. exs. n. 186! Capitula parva etiamsi multiflora. (v. s.)

517. S. PINNATISECTUS, herbaceus glaber, caule tereti striato apice ramoso-corymboso, foliis petiolatis pinnatisectis, segmentis 8-9-jugis subalternis infer. et terminali cuneatis, super. ovalibus, omnibus grossè serrato-dentatis, corymbo composito polycephalo, pedicellis parcè bracteolatis, invol. ovato 8-phyllo post anthesin reflexo, ligulis 5-6, fl. disci circ. 20, achæniis glabris. (I) 2f? in Mexici petrosis umbrosis ad ultimam cataractam flum. Blanco (Llav.). Cineraria pinnata Llav. et Lex. nov. veg. p. 29. Folia pedalia, lobo terminali triangulari, angulis super. obtusis, inf. acuto. (v. s.)

518. S. SANGUISORBÆ, caule herbaceo erecto tereti striato glabriusculo, foliis subtùs puberulis pinnatisectis, radic. longè petiolatis exauritis, caulinis basi ample et rotundè auritis, segmentis 5-7-jugis dentatis terminali majore subrotundo, cæteris ovalibus oblongisve, corymbo conferto polycephalo, invol. ovato 8-10-phyllo glabro parcè calyculato, ligulis 5, fl. disci 15-16, achæniis glabris. (I) 2f? in Mexico (Hænke!), circà Toluccam (Andr. pl. exs. n. 292). Flor. aprili. Herba 1-1 ½ ped. Folia semipedalia. (v. s.)

\*\*\* Radiati, perennes, herbacei, foliis subintegris penninerviis.

519. S. SINUATUS (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 180), caule herbaceo erecto, ramis sulcato-angulatis tenuissimè lanatis, foliis breviter petiolatis oblongis apice basique acutis sinuato-angulatis suprà pubescentibus subtùs pedicellisque cano-lanatis, corymbis ramosissimis fastigiatis, invol. campanulati basi lanati squamis circ. 11, exter. 5 linearibus interiores æquantibus, ligulis 6 enerviis, fl. disci circ. 12, achæniis glabris. 2f in Mexico inter Guanaxuato et Santa-Rosa de la Sierra. Fol. 3-poll., petiolo 3 lin.

520. S. LINEOLATUS, caule herbaceo glabro teretiusculo lineolis fuscis longitudinaliter picto, foliis petiolatis ovali-oblongis utrinque acutis angulis 5-7 repando-sinuatis penninerviis suprà glabris subtùs arancoso-canis, corymbo ramosissimo paniculato, pedicellis araneosis aphyllis, invol. 8-9-phyllo glabro ad margines scarioso brevissimè et parcè calyculato, ligulis 4-5 quadrinerviis, fl. disci 9-10, achæniis glabris. 2f in Mexici Cordillera de Guehilapa octob. flor. legit cl. Berlandier pl. exs. n. 1226 et 1227! Folia caul. 5 pollie, longa, 1-1 ½ lata, petiolo 5-6 lin. (v. s.)