

Hieracium facie hedypnois. *Lob. ic.* 239.

Hedypnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europâ australi. ☉.

7. HYOSERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadio-
Lapsana fructibus globosis pilosis, feminibus disci caly- loides.
culato-papposis. *Hort. ups.* 246. *.
Habitat in Europâ australi. ☉.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. cretica.
Lapsana fructibus ovatis scabris, feminibus disci calyct-
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. *.
Habitat in Creta.

SERIOLA.

1. SERIOLA læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata.
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.
Hieracium ramosum; floribus ampis, calycibus valde
hirsutis, foliis oblongis obtusis; dentibus majoribus
inæqualibus incis. *Raj. suppl.* 144.
Habitat in Creta. ☉.
2. SERIOLA hispida, foliis obovatis subdentatis. æthnensis.
Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*
385. *. *Hort. ups.* 240. *.
Achyrophorus hirsutus; bellidis obtuso folio. *Vaill. act.*
739.
Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.
Habitat in Italia. ☉.
3. SERIOLA hirta, foliis runcinatis. cretensis.
Achyrophorus hirsutus, dentis leonis folio læviter den-
tato. *Vaill. act.* 740.
Habitat in Creta.
4. SERIOLA urens, caule ramoso, foliis dentatis. urens.
Hypochæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-
lycibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 810.
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*
95. *Raj. suppl.* 146.
Habitat in Sicilia.
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.

916. **HYOSERIS.** * *Taraxaconastrum Vaill. A. G.* 1721. 45. 31. 32. 24. *Leontodontoides Mich. gen.* 28. *Hedypnois Tournef.* 271. *Rhagadioloides Vaill. A. G.* 1721. 29. 30.
- CAL.** *Communis* decaphyllus: squamis lanceolatis, erectis, æqualibus, basi calyculatus squamis brevissimis.
Proprius superus, quinquepartitus, brevissimus, acutus, persistens, qui pappi loco.
- COR.** *Composita* subimbricata, uniformis: *Corollulis* hermaphroditis per orbem unum alterumve dispositis.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.
- STAM.** *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.
- PIST.** *Germen* oblongiusculum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER.** nullum. *Calyx comm.* rectus.
- SEM.** solitaria, oblongiuscula, compressa, longitudine calycis.
Pappus capillaris rarior cum *Calyculo* proprio.
- REC.** nudum.
- OBS.** *Taraxaconastri* V. *Semina* extima calyce tridentato, media calyce quinquefido & villis; intermedia solis villis coronata sunt 1, 2, 3.
Leontodontoidis M. *Semina* fere nuda.
Hedypnois T. *Semina* marginalia calycis squamis obtecta, centralia coronata *Calyculo* quinquedentato.
Rhagadioloides V. *Semina* incurva corona paleacea 6.
917. **SERIOLA.** * *Achyrophorus Vaill. A. G.* 1721. f. 28, 13. 21. 18.
- CAL.** *Communis* simplex: *foliolis* linearibus, subæqualibus, erectis.
- COR.** *Composita* imbricata, uniformis. *Corollulis* hermaphroditis, æqualibus, numerosis.
Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata, quinquedentata.
- STAM.** *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulosa.
- PIST.** *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis: longitudine staminum. *Stigmata* duo, reflexa.
- PER.** nullum. *Calyx* immutatus.
- SEM.** oblonga, longitudine calycis. *Pappus* stipitatus, pilosus: radiis decem; lateribus pilosis.
- REC.** paleaceum, longitudine calycis, deciduum. 918.