

Hieracium facie hedyppnois. *Lob. ic.* 239.

Hedyppnois annua. *Tournef. inst.* 473.

*Habitat in Europa australi.* ☉.

7. HYOSERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadio-  
 Lapsana fructibus globosis pilosis, feminibus disci caly- loides.  
 culato-papposis. *Hort. ups.* 246. \*.  
*Habitat in Europa australi.* ☉.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. cretica  
 Lapsana fructibus ovatis scabris, feminibus disci caly-  
 lato-papposis. *Hort. ups.* 246. \*.  
*Habitat in Creta.*

SERIOLA:

1. SERIOLA læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata.  
 Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque  
 folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.  
 Hieracium ramosum, floribus ampis, calycibus valde  
 hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus  
 inæqualibus incis. *Raj. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* ☉.
2. SERIOLA hispida, foliis obovatis subdentatis. athnensis.  
 Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*  
 385. \*. *Hort. ups.* 240. \*.  
 Achyrophorus hirsutus, bellidis obtuso folio. *Vaill. act.*  
 739.  
 Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.  
*Habitat in Italia.* ☉.
3. SERIOLA hirta, foliis runcinatis. cretensis.  
 Achyrophorus hirsutus, dentis leonis folio læviter den-  
 tato. *Vaill. act.* 740.  
*Habitat in Creta.*
4. SERIOLA urens, caule ramoso, foliis dentatis. urens.  
 Hypochæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-  
 lycibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 810.  
 Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 215.  
 Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-  
 scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*  
 95. *Raj. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
 Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.