

Hieracium facie hedychnois. *Lob. ic.* 239.

Hedychnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europa australi. ☉.

7. HYOSERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadio-
Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci caly- loides.
culato-papposis. *Hort. ups.* 246. *.
Habitat in Europa australi. ☉.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. cretica.
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci caly-
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. *.
Habitat in Creta.

SĒRIOLĀ:

1. SĒRIOLĀ læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata:
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.
Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
inæqualibus incilis. *Raj. suppl.* 144.
Habitat in Creta. ☉.
2. SĒRIOLĀ hispida, foliis obovatis subdentatis. æthnensis:
Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*
385. *: *Hort. ups.* 240. *
Achyrophorus hirsutus, bellidis obtuso folio. *Vaill. act.*
739.
Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.
Habitat in Italia. ☉.
3. SĒRIOLĀ hirta, foliis runcinatis. cretensis:
Achyrophorus hirsutus, dentis leonis folio læviter den-
tato. *Vaill. act.* 740.
Habitat in Creta.
4. SĒRIOLĀ ürens, caule ramoso, foliis dentatis. ürens.
Hypochæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-
lycibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 810.
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-
scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*
95. *Raj. suppl.* 146.
Habitat in Sicilia.
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus: