

Hieracium facie hedychnois. *Lob. ic.* 239.

Hedychnois annua. *Tournef. inst.* 478.

*Habitat in Europa australi.* ☉.

7. HYOSERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadio-  
Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci caly- loides.  
culato-papposis. *Hort. ups.* 246. \*.  
*Habitat in Europa australi.* ☉.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. cretica.  
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci caly-  
lato-papposis. *Hort. ups.* 246. \*.  
*Habitat in Creta.*

SERIOLA:

1. SERIOLA læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata:  
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque  
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.  
Hieracium ramosum, floribus amplis, calycibus valde  
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus  
inæqualibus incilis. *Raj. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* ☉.
2. SERIOLA hispida, foliis obovatis subdentatis. æthnensis.  
Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*  
385. \*: *Hort. ups.* 240. \*.  
Achyrophorus hirsutus, bellidis obtuso folio. *Vaill. act.*  
739.  
Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.  
*Habitat in Italia.* ☉.
3. SERIOLA hirta, foliis runcinatis. cretensis:  
Achyrophorus hirsutus, dentis leonis folio læviter den-  
tato. *Vaill. act.* 740.  
*Habitat in Creta.*
4. SERIOLA ürens, caule ramoso, foliis dentatis. ürens.  
Hypochæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-  
lycibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 810.  
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*  
*act.* 1721. p. 215.  
Hieracium alpinum, dentis leonis folio acuto piloso pro-  
scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*  
95. *Raj. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.