

6. *Seriola taraxacifolia*; caule ramoso, foliis radicalibus runcinatis, caulinis superioribus linearibus integerrimis. ○

Sie wird ungefähr anderthalb Fuß hoch, ist bald glatt, bald haarig, und wächst auf den Corsischen Bergen. Sie blüht im Junius.

7. *Gnaphalium angustifolium*; foliis linearibus margine revolutis cauleque subtomentosis; squamis calycinis lanceolatis membranaceis, arcte adpressis, corymbo composito.

Syn. *Gnaph. suffruticosum*, fol. linearibus longis angustis tomentosis margine replicatis, corymbo composito umbellato. Lam. Dict. 2. p. 74b. *Elychrysum angustifolium*. Fl. Franç. suppl. n. 3112. a?

Dieses *Gnaphalium*, welches häufig in Corsica vorkommt, ist von dem Stoechas so verschieden, dass, wenn Hr. Decandolle im Zweifel steht, ob es wirklich eine eigene Art ausmache, ich nicht umhin kann, zu vermuten, er verwechsle es mit *Gnaphalium rosmarinifolium*; fol. linearibus margine revolutis glabris, caule subtomentoso, squamis calycinis lanceolatis coriaceis laxiusculis, corymbo subcomposito. *Elichrysum seu Stoechas citrina rorismarini-foliis*. Barr. obs. 973? *Chrysocome major rorismarinifolio* Barr. ic. 278? *Helichrysum angustifolium* Salzm. *Enumeratio plant.*

Die Blüthen sind grösser, wie bei den vorhergehenden; die Kelchschuppen sind nicht bei-