

* * *Caulescentes.*3. *HYOSERIS HEDYPNOIS*. *Lin. sp.* 1138.

H. caule ramoso, foliis oblongis dentatis hispidiusculis basi attenuatis sessilibus, pedunculis incrassatis, squamis calycinis glabris... *Rhagadiolus hedypnois*. *All. Fl. Ped.* n. 831... *Hedypnois Monspeliensis*. *Willd. sp.* 3, p. 1616... *Hieracium facie hedypnois*. *Lob. Ic.* 239.

Flores lutei; maio, junio.

Habitat in agris regionum australium. ☉

4. *HYOSERIS RHAGADIOLOIDES*. *Lin. sp.* 1139.

H. caule ramoso, foliis oblongis dentatis basi attenuatis sessilibus, squamis calycinis hirtis... *H. Cretica*. *Cav. Ic.* 1, p. 32, t. 43... *Hedypnois Rhagadioloïdes*. *Willd. sp.* 3, p. 1617.

Flores lutei; maio, junio.

Habitat in regionibus australibus. ☉

5. *HYOSERIS CRETICA*. *Lin. sp.* 1139... *Gaert. Sem.* 2, p. 372, t. 160, f. 2.

H. fructibus ovatis scabris, caule ramoso. *Lin...* *Hedypnois (Cretica)* caule diffuso ramoso, foliis oblongis dentatis subcordatis amplexicaulibus, squamis calycis fructigeri glabris apice muricato-setosis. *Willd. sp.* 3, p. 1617.

Habitat in agro Nicæensi. ☉

SERIOLA. *Receptaculum paleaceum. Calyx simplex. Pappus plumosus.*

1. *SERIOLA ÆTHENSIS*. *Lin. sp.* 1139... *Gaert. Sem.* 2, p. 370, t. 59... *Lam. Ill.* t. 656, f. 1.

S. hispida, caule recto ramoso, foliis obovatis dentatis basi attenuatis, pedunculis unifloris subcorymbosis... *S. urens*, *All. Fl. Ped.* n. 851, t. 29, f. 1?

Flores lutei; junio, julio.

Habitat in agris Corsicæ; circà Nicæam? ☉

2. *SERIOLA TARAXACOIDES*. *N.*

S. scapo nudiusculo unifloro, foliis subsagittatis glabris, petiolis remotè dentatis. *Scapus bipollicaris longitudine foliorum, foliolo lineari uno alterove instructus. Folia glaberima plerumquè sagittata, in petiolum attenuata, petiolis remotè dentatis. Calyx polyphyllus simplex erectus glaberimus. Receptaculum paleaceum. Pappus sessilis plumosus.*

Flores lutei.

Habitat in Corsicâ. (Ex herb. D. Richard, qui novum genus esse existimat.) ☿