

Hieracium facie hedypnois. *Lob. ic.* 239.

Hedypnois annua. *Tournef. inst.* 478.

Habitat in Europa australi. ⊖.

7. HYOSERIS fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. Rhagadio-
Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci caly-
culato-papposis. *Hort. upf.* 246. *.
Habitat in Europa australi. ⊖.

8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso. cretica
Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calycu-
lato-papposis. *Hort. upf.* 246. *.

Habitat in Creta.

SERIOLA:

1. SERIOLA læviuscula, foliis obovatis dentatis. lævigata:
Achyrophorus fere glaber, bellidis glauco dentatoque
folio. *Vaill. act.* 1721. p. 278.
Hieracium ramosum, floribus ampliis, calycibus valde
hirsutis, foliis oblongis obtusis: dentibus majoribus
inæqualibus incisis. *Raj. suppl.* 144.

Habitat in Creta. ⊖.

2. SERIOLA hispida, foliis obovatis subdentatis. æthnensis.
Hypochæris calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.*
385. *. *Hort. upf.* 240. *.
Achyrophorus hirsutus, bellidis obtuso folio. *Vaill. act.*
739.
Hieracium multicaule, bellidis folio molli. *Bocc. app.* 8.
Habitat in Italia. ⊖.

3. SERIOLA hirta, foliis runcinatis. cretensis:
Achyrophorus hirsutus; dentis leonis folio læviter dent-
ato. *Vaill. act.* 740.
Habitat in Creta.

4. SERIOLA urens, caule ramoso, foliis dentatis: urens.
Hypochæris foliis dentatis, caule ramoso folioso, ca-
lycibus hispidis. *Sp. pl.* 1. p. 810.
Hypochæris hieracii barbati folio, calyce hispido. *Vaill.*
act. 1721. p. 215.
Hieracium alpinum; dentis leonis folio acuto piloso pro-
scisso, capitulis pungenti lanugine obsitis. *Cup. cath.*
95. *Raj. suppl.* 146.

Habitat in Sicilia.

Calycisquamæ asperæ spinulis pungentibus.