

Picridium discolor.

Calathides solitaires sur des pédoncules bractéolés, enflés au sommet, mais peu épais; folioles extérieures du péri-cline cordiformes, orbiculaires ou ovales oblongues, arrondies avec mucron calleux et largement blanches membraneuses; les bractéoles conformes à mucron allongé; les intérieures oblongues subobtus. Akènes très petits, un peu atténués à la base, trois fois aussi longs que larges, à côtes relevées de trois rangs de tubercules alternes, obtus; réceptacle large peu induré. Feuilles minces, entières ou pennatifides, denticulées ciliées, les caulinaires embrassantes, toutes couvertes sur les deux faces de glandes blanches éparses. Tige grêle striée, peu rameuse; racine annuelle. Plante glabre à calathides discolores, jaunes avec le centre d'un brun pourpre. — Fl. avril-mai.

Lieux sablonneux du Tell et du Sahara : de Mostaganem au Maroc, El-Abiod-Si-Cheik.

Picridium tingitanum (Desfont.) est vivace, à pédoncules robustes; il croît sur les rivages de la mer. *Picridium vulgare* (Desf.) est vivace, à calathides concolores. *P. intermedium* (Schulz) est annuel concolore, à pédoncules un peu gonflés; il a été pris pour le *vulgare* par les auteurs espagnols et français. Ces deux espèces croissent en Algérie : la première sur les rochers, la seconde dans les champs. *P. ligulatum* (Vent.), du Maroc, est subfrutiqueux, à fleurs concolores, à feuilles blanches, papilleuses.

Sonchidium.

Le *Sonchus maritimus* ne peut rester dans le genre typique, dont il n'a pas les akènes. Voici ses caractères : Péri-cline embriqué, plus ou moins urcéolé. Akènes subprismatiques, tronqués à quatre côtes obtuses non striées, peu inégales. Aigrette sessile à soies égales, simples, réceptacle nu.