

Folia non subtus glauca, Pedunculi non tomentosi sed tantum subfarinosi. Involucra et Involicella nulla, folia vero sparsa in pedunculis ramosis, non umbellatis, lanceolata. W.

*5. SONCHUS acidus.

S. pedunculis ramosis nudis, calycinis squamis patulis, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis, caule fruticoso. W.

Sonchus acidus. Schousbœ in litt.

Sauere Gänsefiedel. W.

Habitat in imperio Maroccano, ♂ (v. f.)

Folia semipedalia petiolata glabra pinnatifida, laciniis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis. Pedunculi valde ramosi subdichotomi subumbellati nudi. Flores magnitudine S. ardensis. W.

*6. SONCHUS pinnatus. †

S. pedunculis nudis, calycibus laevibus, foliis pinnatis, pinnis linear-lanceolatis subdentatis. Ait. Kew. 3. p. 116.

Gefiederte Gänsefiedel. W.

Habitat in Madera. ♂

*7. SONCHUS radicatus.

S. pedunculis nudis calycibusque glabris, caule subnudo, foliis radicalibus lyratis utrinque laevibus, lobis trianguli-ovatis. Ait. Kew. 3. p. 116.

Bewurzelte Gänsefiedel. W.

Habitat in Madera. ♂

*8. SONCHUS taraxacifolius. W.

S. pedunculis squamosis, floribus paniculatis, foliis runcinatis calloso-dentatis basi attenuatis. W.

Löwenzahnblättrige Gänsefiedel. W.

Habitat in Guinea. (v. f.)

Caulis crassitie pennae anserinae spongiosus. Folia confertiuscula Taraxici basi attenuata glabra dentata, dentibus apice albis. Folia superiora lanceolata fere indivisa subdentata; summa linearia integerrima. Pedunculus communis paucis foliis instructus, semipedalis et ultra, apice in paniculam divisus. Pedunculi pro-