

*S. pedunculis* subquamosis, foliis lyrato - hastatis. *Sp.*

*pl. 1118.*

*S. caule* erecto, foliis pinnato-dentatis: radicalibus latissimis obtusis, floribus racemosis. *Roy. lugdb. 129.*

*S. annuus* canadensis altissimus laciniatus, flore coeruleo. *Vaill. act. 1721. p. 198.*

*Lactuca altissima*, folio sonchi laciniato, flore parvo coeruleo. *Boerh. lugdb. 1. p. 81.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 29.*

Floridanische Gänsefistel. *W.*

*Habitat in Virginia, Canada. ♂ (v. v.)*

\* 30. *SONCHUS acuminatus. W.*

*S. pedunculis* subquamosis, floribus paniculatis, foliis radicalibus subbruncinatis, caulinis ovatis acuminatis petiolatis. *W.*

*Lactuca villosa.* *Jacq. hort. Schoenb. 3. p. 62. t. 367?*

Zugespitzte Gänsefistel. *W.*

*Habitat in America boreali. (v. f.)*

*Folia radicalia subbruncinata, caulina petiolata ovata utrinque attenuata apice acuminata margine in medio denticulis parvis acuminatis in utroque latere. A S. floridano foliis caulinis indivisis distinctus. W.*

*Lactuca villosa Jacq. forte ab hac planta non diversa. In nostra folia subtus, sub lente tantum, pilis rarissimis obsita, panicula angusta et pauciflora, et pappus sessilis. Specimen meum est spontaneum, ergo panicula angustior, et pappi structuram non indicavit Clarisf. Jacquin. W.*

\* 31. *SONCHUS pallidus. W. †*

*S. raceme* composito terminali, foliis lanceolato-ensiformibus amplexicaulibus dentatis. *W.*

*Lactuca (canadensis)* foliis lanceolato-ensiformibus amplexicaulibus dentatis inernibus. *Sp. pl. 1119.*

*Lactuca canadensis altissima angustifolia* flore pallide luteo. *Tournef. inst. 474.*

*S. sylvestris*, folio laciniato glauco, costa non spinosa. *Raj. suppl. 137.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 38.*

Bleiche Gänsefistel. *W.*

*Habitat in Canada. Kalm.*