

apiculados, acastañados, al fin negros, señalados con 7-8 costillas longitudinales y transversalmente rugosos; pico blanco de la doble long. del aquenio.

Vive aunque escasa al borde de la via férrea en San Clodio, *Orense*.

× **Sonchus aemulus** (*S. oleraceus* < *asper*) (hy. n.).

Folia pinnatipartita, segmento terminali triangulari, lateralibus minoribus ovatis aut oblongis, infima et media auriculato-amplexicaulia, auriculis minus rotundatis quam in *S. aspero*, superiora auriculis patentibus acutis haud amplexicaulibus; achenia oblonga 3-5 costata, breviter marginata nec transverse rugosa. Cum parentibus ad Salcidos.

Las hojas son pinnado-partidas con el segmento terminal triangular y los laterales menores aovados u oblongos, las ínfimas y medias auriculado-abrazadoras no siendo las aurículas tan redondeadas como en el *S. asper* Hill., aurículas de las hojas superiores patentemente agudas no abrazadoras; aquenios oblongos con 3-5 costillas longitudinales con margen angosto y sin rugas trasversales.

Vive en terrenos frescos cultivados de Salcidos, *Pontevedra*, asociada a sus padres; pero predominando los caracteres del *S. asper* Hill.

**Sonchus tenerrimus** L. a) *annuus* Lge. (V. *Fl.* T. II pág. 473).

El Sr. Várquez Estéves ha tenido la fortuna de recoger en las cercanías de Arbo, *Pontevedra*, una abundante colección de las diversas formas que ofrece esta esp., la qual juntamente con los ejemplares reunidos por nosotros hemos procurado examinar cuidadosamente no habiéndonos sido posible ajustarlos a las 3 variedades señaladas por Lange en el *PRODR. FL. HISP.* T. II pág. 241. Tal es el polimorfismo de la planta anual. Los segmentos foliares ya 3-4 laterales ya I y a veces ninguno reducida entonces la lámina al segmento terminal. Dichos segmentos laterales aun en el mismo pie pasan de la configuración ovalada o aovado-lanceolada a la lineal. La parte superior del tallo ya lisa ya estipita-