

33. *S. ustulatus* (Lowe! prim. fl. mad. p. 22), caule ad collum fruticoso brevissimo, foliis radicalibus confertis pinnatifidis glabris subtus inter venas glaucescentibus, scapis aphyllis ramoso-divaricatis, pedicellis subcorymbosis nudis, invol. squamis adpressis nigricantibus, exter. brevissimis, inter. apice pallidis. ♂ in Maderâ. *S. hyoseridifolius* Horn. h. hafn. 2. p. 752?

a. *latifolius* (Lowe! l. c. sub var. β), foliorum lobis ovatis mucronatis subangulatis, terminali basi rotundato apice acuminato. — in rupibus maritimis. (v. s. comm. à cl. Lowe.)

β. *angustifolius* (Lowe! l. c. sub var. α), foliorum lobis angustis confertis acuminatis margine posteriore subintegerrimis. — *S. dentatus* Banks herb. ex Lowe. (v. s. comm. à cl. Lowe.)

Sect. III. ATALANTHUS. — *Atalanthus Don in Edinb. phil. journ. 1829. et in linnæa 1830. litt. p. 144.* — *Prenanthis* sp. auct.

Capitula basi non tumentia 5-20-flora. — Caules fruticosi.

34. *S. ARBOREUS*, caule arboreo tereti inerini, foliis pinnatipartitis, lobis linearisub lanceolatis integerrimis, corymbis terminalibus polycephalis. ♂ in insulâ Teneriffâ (Brouss.!). *Prenanthes arborea* Brouss.! elench. h. monsp. p. 47. Willd. enum. suppl. 54. mag. nat. ges. berl. 1807, p. 137. Link enum. 2. p. 282. Folia triplici lineâ spirali secûs ramosa disposita. Foliorum lobi approximati 1-2 lin. lati. Capitula majora quam *S. pinnati*, 15-20-flora. Peractâ anthesi apex rami pedunculiformis exsiccatur et gemma è supremâ axillâ orta ramum continuat. (v. s. sp. et v. c. in hort. monsp.)

35. *S. LEPTOCEPHALUS* (Cass. dict. 43. p. 281), caule fruticoso inermi, foliis pinnatipartitis, lobis linearisiliiformibus integerrimis, paniculis terminalibus corymbosis polycephalis. ♂ in rupibus Teneriffæ (Mass. Brouss.!. C. Smith! Chain.!. Gaud.!). *Jaeq. f. eclog. 1. p. 30. t. 19.* *Prenanthes pinnata* Linn. f. suppl. 347. non Ait. *Chondrilla pinnata* Lam. dict. 2. p. 79. Cor. 5-6 in capitulo flavae. Foliorum lobi inaequales remoti vix semilineam lati. Caules subcarnosuli cicatricibus fol. veterum notati. (v. s. sp. et v. c.)

36. *S. SPINOSUS*, caule fruticoso ramosissimo, ramis teretibus divergentibus spinosis, foliis sessilibus linearibus dentato-sinuatis, pedunculis 1-cephalis nudis. ♂ in collibus Hispanie ad Cuevas Overa (Lag.!), in arenis maritimis regni Granatensis (Boiss.!), in fissuris rupium Africæ borealis ab ins. Canariis! ad Arabiam! et montem Sinaï (Bové!), in regione Wadi Heban Arabie petraeæ ubi *Kabat* dicitur (Schimp.!), ad Suéz et Ispahan (Auch.). *Prenanthes spinosa* Forsk. deser. 144. Vahl symb. 2. p. 66. *Lactuca spinosa* Lam. dict. 3. p. 408. Desf. fl. atl. 2. p. 227. *Phænixopus spinosus* Cass. dict. 48. p. 426. — Park. theatr. 804. f. 7. ex h. kew. Habitus ferè *Phænoporum* sed acheniis erostre. Invol. cylindraceum, squamis margine subscariosis. (v.s.)

+ Species non satis notæ.

37. *S. CAUCASICUS* (Bieb. in Horn. h. hafn. suppl. p. 88), caule hirsutissimo, foliis radical. lyratis, caulinis cordatis sessilibus amplexicaulibus grossè serratis, pedunculis apice incrassatis, invol. corymbosis ovatis. ♂ in Caucaso-An fortè Mulgedii sp.?

38. *S^p CREPIOIDES* (Smith in Rees cyclo. n. 24), caule tereti subpubescente ramosissimo paniculato, foliis summis amplexicaulibus linearisiliiformibus villoso-farinosis, invol. ovatis pubescenti-farinosis. — in littoribus Mauritaniæ propè Lacalle. *Scorzonera crepioides* Poir. dict. 7. p. 25. An vera *Crepidis* spec.?

39. *S. FLEXUOSUS* (Ledeb. h. dorp. suppl. 1. p. 5), caule flexuoso, ramis subfastigiatis, foliis caulinis ovato-oblongis repando-dentatis rugosis, pedunculis incrassatis hispidis. — Cæt. ign.

40. *S. LACTUCOIDES* (Bunge enum. pl. chin. n. 228), caule erecto simplici gla-