

» 1-3-floris. » Nob: Radix crassissima fibrosissima uti basis caulis rubescens; caulis linearis erectus tenuissime striatus, anthodii squamæ lineares, flores medioeres lutei (Patria?).

66. *H. heterospermum* = Schult: ex hb: Birol: Erectum sub-simplex hispidiusculum, folia oblonga sagittato-amplexicaulia glabrescens argute dentata margine brevissime ciliata, paniculae divaricatae rami 1-3-flori, pedunculi apice incrassati sub-nudi, anthodii squamæ simplices erectæ demum naviculares incrassatæ, semina difformia (Patria?). = 67. *H. crassifolium* = Schult: sec: Steud: Glaberrimum simplex superne paniculato-ramosum, folia sub-carnosa inferiora lineari-lanceolata longissima sub-denticulata superiora sensim minora integerrima, panicula corymbosa foliosa ramis squamosis sub-3-floris, flores ampliusculi (Patria?).

CLIV. *SONCHUS* Lin: gen: ed: Schreb: n. 1233. = Spr: syst; n. 2880. = Lam: ill: t. 649.

» *Anthod: imbricatum* ventricosum, squamis seu laciniis inæqualibus margine sub-scariosis. *Receptac:* nudum. *Pappus* sessilis.  
 » *Obs:* Genus a *Hieracio* distinctum præsertim anthodii forma, habitu magis accedens ad *Lactucam*, constans ex Spr: 45: stirpibus, quarum 10: fruticosæ africanæ, ceteræ herbacæ per orbem sparsæ, foliis indivisis runcinatis vel pinnatifidis, inflorescentia varia.

anthodiisque glabris, corollulæ parciore et valde majores.

17. *S. hispanicus* = Jacq: h. Schoënbr: II. p. 9. t. 143. (*Hispania*). Ann: *S. tingitano* n. 12. simillimus, sed tactu glabro, colore glauco, et punctis albidis diversus.

γ Foliis pinnatifidis.

18. *S. chondrilloides* = Desf: atl: II. p. 226. (*Sicil: , Numid:*). Perenn: Ramosus undique glaber, foliorum laciniæ lineares remotiusculæ sub-decurrentes, pedunculi elongati incrassati 1-flori, flores amplexicaules. Specim: dubium sub nomine *Scorzoneræ resolidifoliæ* a W. distinctæ, a Spr: conjunctæ cum *S. chondrilloideo*; notandum tamen, figuram Bocconi a W. citatam eandem esse ac illam a Desf: relatam.

19. *S. tenerrimus* = L. sp: 1117. = Spr: syst: III. 651. = Pluk: phyt: 93. f. 3. Ic: taur: vol, 18. t. 86. f. 2. (*Gallia austr:, Barbaria, Italia*. Abunde in comit: *Nicæensi* et *Liguria* All: n. 816. *Genuæ* in mœniis præcipue maritimis Bertol: am: ital: p. 187. *Sardin:* ad vias et muros frequens Moris st: sard: II. p. 9.). Ann: Ramosus glaber, folia polymorpha, pedunculi et anthodia pilosa.

*Sonchi dubii.*

α.

20. *S. pensylvanicus* = Ex hb: MOLINERI. Glaberrimus, folia indivisa petiolata elliptica spinuloso-serrulata, flores paniculati parvi (*Patria?*). = 21. *S. lon-*

*gifolius*? = Enatus e seminibus missis a cl: BALBISIO sine alia indicatione, valde accedit ad *S. asperum*, a quo differt tantum foliis longioribus basi amplexicaulibus sub-sinuatis ac evidentius spinuloso-dentatis; statura quoque undique major forsitan ex cultura (Patria?). = 22. *S. chinensis* = Fisch: Ita in scheda ex hb: BIROLI. Planta elata simpliciuscula undique glaberrima, folia indivisa ovato-oblonga in petiolum attenuata acuta inæqualiter sub-dentata, panicula ampla sub-fastigiata, flores flavi (Patria?). = 23. *S. australis* = H. Erf: ex hb: BIROLI. Glaber simplex, folia elongata runcinata laciniis ovatis linearibusve sub-dentatis, pedunculi 1-2-flori, flores flavi (Patria?).

CLV. RODIGIA Spr: syst: n. 2882. = *Crepidis* et *Seriolæ* spec: alior:

» *Anthod:* sub-imbricatum involucreatum. *Recept:*  
» paleaceum. *Pappus* stipitatus. »

*Obs:* Genus a SPR: statutum pro 2. tantum stirpibus herbaceis a *Crepide* et *Seriola* divulsis, quarum unam possideo ex hb: BIROLI (*R. lævigata* SPR: syst: III. 654.; sub *Seriola* L.), *Siciliæ* et *Numidiæ* incolam. Herba perenn: scapigera, foliis oblongis spatulatis sub-dentatis glabris, scapo squamuloso, anthodio *hirsuto* nec *glabro* uti in phrasi SPR:

CLVI. PRENANTHES Lin: gen: ed: Schreb: n. 1236. = Spr: syst: n. 2883. = Gærtn: fr. II. p. 358. t. 158. f. 1.

» *Anthod:* simplicissimum basi calyculatum. *Recept:*  
» nudum. *Flosculi* simplici serie 5. circiter. *Pappus*  
» sub-sessilis. »