

Léopoldville, 30 avril 1915 (J. Bequaert, n. 7488. — Steppe boisée ; fleurs jaunes) ; Entre Ipamu et Kikwit, 1915 (H. Vanderyst, n. 9792) ; Butulu, 1915 (H. Vanderyst, n. 5626) ; Léopoldville, 1914 (J. Bequaert, s. n. — Steppe boisée) ; Yungu, octobre 1915 (H. Vanderyst, n. 5787) ; Kikwit, 1921 (H. Vanderyst, n. 9981) ; Kisantu, octobre 1924 (H. Vanderyst, n. 13689) ; Mue, 1915 (H. Vanderyst, n. 5583) ; Kinzulu, avril 1919 (H. Vanderyst, n. 2018).

## SONCHUS L.

### *Sonchus Bequaerti* De Wild. nov. spec.<sup>(1)</sup>

Plante paraissant pérennante, à tige dressée ou lianiforme, plus ou moins ramifiée, ligneuse à la base, atteignant plus de 70 cm. de haut, glabre mais velue, cotonneuse et à poils glanduleux dans les inflorescences, à rameaux grêles, plus ou moins divariqués ; feuilles linéaires, non divisées, la plupart embrassantes, auriculées à la base, sessiles, aiguës au sommet, entières ou plus ou moins nettement denticulées sur les bords, feuilles des rameaux latéraux ou du milieu de la tige, parfois non auriculées, de 6-17 cm. de long et 4-14 mm. de large ; capitules assez densément rapprochés, de env. 14 mm de long et de env. 5 mm. de large, fleurons non compris, à env. 30 fleurs, tomenteux-blanchâtres à la base, à pédicelles allongés, grêles, généralement velus, souvent à poils glanduleux, atteignant 5-13 mm. de long et parfois bractéolés vers le milieu, disposés en corymbe plus ou moins lâche, bractées extérieures de 3-4 mm. de long, passant aux intérieures au

---

(1) *Sonchus Bequaerti* ; Herba, sublignosa vel subcandens. Caulis ultra 70 cm. altus, striatus, glabrus, sed apice piloso-glandulosus. Folia basilari lineari, integra, basi auriculata, sessilia integra vel plus minus denticulata, ramuli plerumque non auriculata, 6-17 cm. longa et 4-14 cm. lata. Corymbi plus minus dense cephalii, capitulis circ 14 cm. longis et circ. 5 mm. latis, circ. 30-floris, basi albido-tomentosis et glandulosis. Involucris squamae exteriorae 3-4 mm. longae, interiorae circ. 8-10 usque 11 mm. longae et 2 mm. latae. Achaenia parva, 2-3 mm. longa, striata, rugosa. Floribus luteolis. Pappus albus circ. 7 mm. longus.

nombre de 8-10, atteignant 10-11 mm. de long et 2 mm. de large, glabres ; akènes de 2-3 mm. de long, striés longitudinalement, rugueux sur les stries, terminés par des soies de 7 mm. de long, fleurons jaunes.

Ruwenzori, vallée du Butagu, 11 avril 1914 (J. Bequaert, n. 3546. — Vers 1600-1800 m. d'altitude ; fleurs jaunes) ; Ruwenzori, vallée du Butagu, 15 avril 1914 (J. Bequaert, n. 3696. — Vers 2300 m. d'altitude ; fleurs jaunes) ; Ruwenzori, vallée du Lanuri, 25 mai 1914 (J. Bequaert, n. 4476. — Vers 1900 m. d'altitude. — Lianiforme herbacée, à fleurs jaunes).

**Observations.** — Nous sommes amené à signaler cette plante, paraissant assez variable sous un nom spécifique nouveau, tout en la rapprochant du *S. Bipontini* Aschers., et par suite aussi du *S. kabarensis*, décrit ci-après (cf. Fl. trop. Afr. III, p. 458).

Dans cette dernière espèce nous n'avons pas observé de feuilles auriculées à la base, dans le *S. Bequaerti* les feuilles sont le plus souvent auriculées, et même fréquemment les feuilles raméales supérieures présentent latéralement des appendices basilaires développés.

Il y a entre les deux plantes une différence dans le nombre des fleurs, bien plus considérable dans les formes du Ruwenzori, les rugosités des akènes sont moins marquées chez le *S. Bequaerti* que chez le *S. kabarensis*, mais nous n'oserions certifier que ces organes sont dans des stades totalement comparables. Le grand nombre des akènes ne pourrait-il pas influencer le détail de leur structure.

Toutes les formes que nous rapportons au *S. Bequaerti* ont des capitules nettement cotonneux à la base et le pédicelle floral est pour tous garni de poils glanduleux plus ou moins abondants, en tous cas nettement visibles.

Comme nous le répéterons pour le *S. kabarensis* ces descriptions doivent être considérées comme préliminaires ; le *S. Bipontini* Aschers., doit être réétudié non seulement sur le type mais aussi sur les documents qui lui ont été rapportés.

**Sonchus Bipontini** Aschers. in *Schweinf.* Beitr. fl. Aethop. (1867) p. 160 in obs. ; *De Wild.* Etudes Fl. Katanga II (1913) p. 179 ; *Oliv. et Hiern* in Fl. trop. Afr. III p. 458.

— — var. **pinnatifidus** *Oliv. et Hiern* in Fl. trop. Afr. III (1877) p. 458.

Ruwenzori, vallée de la Lamia, 16 mai 1914 (J. Bequaert,