

glabrescentia, dilutè brunnea, pl. paucā tantum fertilia, reliqua effœta, albentia. Nectarium conspicuum, albens. Pappus caducissimus, 2 1/4 lin. longus, niveus, 1-serialis, setis paulo complanatis, denticulatis, subæqualibus et hinc à Sonchis reliquis paulo diversis.

## EXPLICATIO TAB. 136.

1. Panicula florida. 2 et 3. Folia caulinæ. 4. Flos. 5. Stamen. 6. Styli pars superior.
7. Achænum cum pappo caduco. 8. Pappus. 9. Achæni apex ex alto visus ut appareat nectarium. 10. Achæni sectio transversalis.

Subgen. V. *EUSONCHUS*. C. H. Sch. Bip. MS.

## 15. SONCHUS BOURGEAUII. C. H. SCH. BIP.

S. annuus; caule dichotome ramoso, foliato, glabro cum foliis confertis, runcinato-pinnatifidis, dentato-spinulosis, costâ folii acute prominente in caule alâ acutâ pellucidâ (simili modo ut in S. palustri) decurrente; involucro basi tomentoso, campanulato, cum petioli parte superiore pilis glanduliferis dense obsito; floribus aureo-aurantiacis, speciosis, involucrum dimidia parte superantibus; achæniis compressis, robustis, obovatis, inferne attenuatis, brunneis, transverse valde rugoso-granulatis; pappo niveo, persistente, pluriseriali.

HAB. *Fuertaventura*, n. 9, sine loco speciali, et in lava volcani *Oliva*, die 19 Febr. 1846, n. 12: Bourgeau! et Lancerotte in *Baranguillo* supra pagum de *Mala Die*, 2 Febr. 1845: Bourgeau! n. 7.

DISTRIB. GEOGR. Herba merè canariensis.

DESCR. Prima fronte affinis S. lœvi Camer., sed floribus speciosis obscurè aureo-aurantiaceis statim distincta. RADIX annua. CAULIS spithameus, — 5/4-pedalis, infernè 5/4-2 1/2 lin. diametro metiens, teres, sed foliorum costa, in alas 1/2-fere 1 lin. latas decurrente acutangulus, viridis, pl. vero + purpurascens, inferne densè foliatus. FOLIA 2-4 poll. longa, superne 1-3 poll. diametro metientia, oblongo-obverse-lanceolata, runcinato-pinnatifida, pinnis utrinque 3-4, trianguli-oblongo-lanceolatis, retrorsis, cum lobo terminali trianguli-lanceolato acutis, inæqualibus et conferte spinulosodentatis, in petiolum decurrenti-alatum, basin versus dilatatum, utrinque in lobos hemisphærico-triangulares, extus convexos, intus rectos, spinulosos, acentos protractos et hinc *sagittata*, cæterum papyracea, glabra, infrâ glabrescentia, saepius præsertim costa purpurascentia; folia inferiora longius petiolata, basi paulo protracta, costâque minus prominente munita, media maxima, costâque valde prominente et lobis basilaribus magis instructa. Ad medium caulis dichotome ramificatur. RAMI in axi foliorum caulinorum orientes sed minorum, inferiorum pinnatifidorum, superiorum integrorum, linearis-lanceolatorum, omnium setoso-denticulatorum, basi dilatatorum et in lobos magnos sagittæ-

formes protractorum. Rami inferiores iterum ramosi in corymbum compositum abeuntes, superiores vero in simplicem. PEDICELLI pl. 1-2-pollicares, nudi vel squamu*lā* unica muniti, glabri vel superne pilis glanduliferis muniti patentibus. INVOLUCRUM campanulatum, pl. 1/2 poll. altum, subimbricatum, squamis omnibus adpressis, demum reflexis pedicelloque adpressis, internis subæqualibus n. 13 linearibus, obtusis, dorso pilis glanduliferis sparsis munitis, externis n. 8 internis 2-4-plo brevioribus, pilis glanduliferis, ad basin tomento involuci immersis, valde hispidis. Basi involucrum demum spongiosè et ventricosè dilatatum, ita ut pili ejus inferiores reversi sint. RECEPTACULUM 2 1/2 lin. diametro meticus, nudum, planum. CAPITULUM multiflorum, semper erectum. FLORES obscure aurei, in aurantiacum vergentes, 7 lin. et ultra longi; ligula glabra, apice 5-dentata, 1 lin. fere lata, tubum pallentem, pilis articulatis simplicibus superne obsitum, 2 lin. longum plus duplò superans. ANTHÈRE pallide aureæ, fere 1 1/2 lin. longæ, filamentis glabris insidentes; styli rami filiformes, hirti, demum arcuati antheris 5/4 lin. longiores. ACHÆNIA conformia, articulatè cum receptaculo juncta, vix 1 lin. longa, superne 1/2 lin. lata, compressa, crassa, obovata, superne paulisper, inferne valde attenuata, brunnea, distinctissimè transversè rugoso-muricato-granulata more Pieridis v. Pieridii. PAPPUS 2 1/2 lin. longus, persistens, niveus, pluriserialis, setis numerosissimis, tenuissimis, simplicibus, quibus pauci intermixti sunt crassiores, denticulis extrorsis more Eusonchorum muniti.

## EXPLICATIO TAB. 136 B.

1. Planta integra magnitudine naturali, figuræ reliquæ magn. auctæ. 2. Flos. 3. Achænum cum pappo. 4. Pilus pappi longior. 5. Pilus pappi brevior.

## 16. SONCHUS LÆVIS. CAMER.

S. annuus; pedicellis glabris vel pilis glanduliferis munitis; floribus sulphureis involucrum paulo superantibus; foliis integris, pinnatifidis vel laceris, carinæ acutiusculis, non verò alatis et in caule decurrentibus, margine pl. mitioribus, sagittatis; achæniis obovato-lanceolatis compressis, utrinque bisulcatis, rugoso-granulatis, rugis in series 25-30 dispositis transversales.

Var. etiam in Insulis Canar. foliis mitioribus et valde spinosis varie divisis, pedicellis glabris vel pilis glanduliferis hispidis.

Sonchus non asper. *Fuchs*, p. 675, c. icone!

Sonchus lœvis. *Camer.*, *Epit.*, p. 279, c. icone!

Sonchus oleraceus α et β. *Linn.*, *Sp. pl.*, ed. 1, p. 794; ed. 2, p. 1117.

Synonymia tædiosæ agmen alio enumerabo loco et tantum hic Candolleana adducam.

Sonchus zacynthoides. *DC.*! *Pr.*, 7, p. 184.

Sonchus Royleanus. *DC.*, l. c.

Sonchus ciliatus. *Lam.* — *DC.*, *Pr.*, 7, p. 185.

Sonchus reversus. *E. Mey.* — *DC.*, *Pr.*, 7, p. 186.

Sonchus roseus. *Besser.*! — *Ledeb.*! — *DC.*, *Pr.*, 7, p. 190.



*Sonchus Bourgeauii* Sch. Bip.