

*Lactuca falicis* folio, flore coeruleo. *Amm. ruth. n. 211.*

Occurrit in Tauriâ et in Caucaſo altiore. ♀

*Dignoscitur* a ſubſequentē *foliis* teneris vulgo minus profunde diſſectis: caulinis baſi latioribus ſubcordatis utrinque hamo paruo acuto, *pedunculis* inferioribus longioribus in corymbum, *floribus* nonnihil minoribus. Quoad reliqua maxime *affinis*. *Pumilum* dodrante minorem legi ad radices alpis Kaiſchaur, Septembri florentem.

1582. *SONCHUS tataricus.*

*S.* pedunculis ſquamatis calycibusque glabris, floribus paniculatis, foliis oblongis ſubruncinatis: caulinis baſi attenuatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1522. Lamark dict. 3. p. 400. n. 11.*

*Lactuca falicis* folio ferrato, flore caeruleo, *Amm. ruth. n. 212.*

Frequens ad littora marina Tauriae et in argilloſis ſubſalis Caucaſo mare caſpium verſus ſubſiſcentibus. Floret Julio, Auguſto. ♀

*Radix* valde repens. *Folia* rigida ſubcarnoſa plerumque omnia runcinata denticulata. *Pedunculi* et huic ſquamofi, minus elongati quam praecedentis.

1583. *SONCHUS cacaliaefolius.*

*S.* pedunculis ſquamatis hiſpidis, calycibus glabris, floribus ſubcorymbofiſ, foliis haſtato-triangularibus: petiolis foliaceis amplexicanlibus, ſuperioribus ſeſſilibus cordato-fagittatis.

Habitat in Iberiâ. *D. Steuen.*

*Caulis* ſimpliciſſimus bipedalis ſtriatus ſuperne piloſo-hiſpidus. *Folia* lata denticulata ſcabra haſtato-triangularia: inferiora petiolo foliaceo-marginato dentato amplexicanli ſagittato-auriculato, ſuperiora minora ſeſſilia acuminata. *Pedunculi* ex ſummorum foliorum axillis multiflori ſubcorymbofi glanduloſo-

hispidi. Flores magnitudine et colore praecedentis: calycibus glabris. Haberem pro *S.* foliis lanceolatis sessilibus denticulatis caulibus hispidis *Gmel. fib. 2. p. 12. n. 12. t. 4. f. 1*, nisi calyces essent glabri.

1584. *SONCHUS prenanthoides*.

*S.* pedunculis squamatis viscosis, calycibus glabris, racemo terminali composito elongato, foliis ovato-oblongis basi lyrato-runcinatis attenuatis.

Habitat in Caucasi fyluis altioribus. Floret Julio, Augusto. ♀

Caulis simplicissimus bipedalis sulcatus villosus. Folia magna lata denticulata non acuminata basi runcinata: inferiora sublyrata in petiolum marginatum denticulatum attenuata. Panícula terminalis racemosa composita conferta elongata viscida. Flores magnitudine *Prenanthis purpureae*: corollulis coeruleis.

394. *LACTUCA*. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindricus: margine membranaceo. Pappus simplex, stipitatus. Semina laevia.

1585. *LACTUCA altissima*.

*L.* foliis denticulatis glabris: imis sinuatis, superioribus lanceolatis sagittatis acuminatis, paniculâ ramosissimâ subcorymbosâ.

Habitat ad riunorum margines, prope Caucasi acidulam Narzana. Floret aestate.

Planta glabra orgyalis et ultra: ramis floriferis plurimis paniculatis subcorymbosis. Folia pleraque indivisa lanceolato-sagittata exquisite acuminata denticulata. Flores magnitudine *L. sativae*: corollulis luteis. Semina nigra. A *L.* sagittatâ differt foliorum denticulis majoribus et lobis baseos multo longioribus