

Sonchus capillaris Svent, nova spec.

Sectio *Atalanthus* DC.

F RUTEX 100-200 cm. alt., robustus, multicaulis; caulis erectis, rigidis, simplicibus vel vix ramificatis versus apicem, ramis tortuosis; cortice glabro cum cicatricibus parum notabilibus, fuscescenti in truncis veteribus, lucente albo-lutescenti in truncis juvenilibus. Foliis glomeratis versus apicem ramulorum juvenilium, paucis, ephemeras, 8-20 cm. long., ambitu lanceolato, nitido-glabris, pinnatisectis cum 5-9 iugis segmentorum alternorum, gracilissimis, 2-8 cm. long., 0,2 mm. lat., acutissimis, angustissimè viride-marginatis, non decurrentibus, rhaqui filiforme; petiolo 1-3 cm. long. Stipite florali 10-15 cm. long., rigido, cylindrico, tomentoso-pannoso vix folioso ad basim; foliis caulinariibus cum segmentis brevissimis, setaceis; inflorescentia paniculato-corymbiforme, laxa, 15-20 cm. diam., cum 2-4 ramis inferioribus; ramis et ramusculis erectiusculi-divergentibus; bracteis tenuissimis, subulatis; pedunculis valde inaequalibus longitudine, aequivalentibus capitulis imo bis ter longioribus; capitula 10-15-flora, ca. 10 mm. diam.: involucro subcylindrico, ca. 5 mm. long., vix 2 mm. diam.; bracteis involucralibus glabris, virido-rubescensibus, externis linearri-attenuatis, obtusis; internis linearri-lanceolatis, obtusiusculis, margine hyalino, inferne integro, scarioso-ciliato apud apicem; floribus periphericis 6 mm. long. cum tubo vix 2 mm. lat., dense albo-piloso-glandulosso in dimidio superiore; ligula pallide-lutea, 4 mm. long., 2 mm. lat., ovalata, apice truncato, quinque-denticulata, denticulis acutis; staminibus 1/4 brevioribus quam ligula; stylo inclusu; laciniis stigmarum ca. 1 mm. long., dimidie exsertis. Achaenio linearifusiformi, valde ad basim attenuato, compresso, ca. 5 mm. long., deaurato, quinque-striato, minutissimè albo-papilloso, apice albo-stipitato; villo achaenium longiore, sub-biseriali, inaequali, valde deflexo atque caduco cum setis denticulato-setosis, albis.

Floret et fructificat Septembri-Novembri.

Habitat inter rupes apricas et siccas.

Locus originis: Nivaria (Tenerife) in magno anfractu, vulgo dicto "Barranco de Tejina" inter 400-700 m. alt., ubi datur plus minusve abundans. Legit cum flore et fructu die 18 Octobris 1957

Sonchus capillaris est planta valde xerophila, sed major pars anni in statu aphylio. Invenitur sat frequens in locis calidis et petrosis regionis australis Nivariae, et de testimoniis a diversis auctoribus factis pro *Sonchu leptocephalo* Cass. in hac regione aliqui debent, sine dubio, esse referenti ad *S. capillarem*, qui est magis affinis *S. filifolio* mihi, quam ad speciem anteriorem.

EXPLICATIO TABULÆ XXXV

Sonchus capillaris Svent.

α . Caulis floriger et fructiger; β . idem foliosus (ambo magnitudine naturali); γ . bractea involucralia externa; δ . idem interna (ambae 4 x auctae); ϵ . flos (5 x); ζ . achaenium cum villo a ventre; η . idem a lato visum (ambo 10 x aucti).



Sonchus capillaris Svent.