

- incrassatis squamosis, squamis anthodii ovatis appressis. *Gallia austr. Italia. Afric. bor.* (Scorzonera picroides L., Picridium vulgare Desf., Reichardia picroides Roth.)
- tingitanus* Lam. 33. S. caule subramoso, foliis inferioribus runcinatis scabris denticulato-ciliatis, superioribus oblongis sinuato-pinnatifidis, pedunculis incrassatis squamosis, squamis anthodii scariosis squarrosis. *Numidia. Aegypt.* (Scorzonera tingitana W.)
- capitatus* * 34. S. subcaulis, foliis runcinatis glabris glaucescentibus, laciniis obtusis albo-spinuloso-ciliatis, scapis prostratis sub-1phyllis, floribus terminalibus glomeratis, squamis anthodii ovatis appressis scariosis, seminibus angulatis. *Aegypt.* (Chondrilla capitata Sieber.)
- racemosus* Lam. 35. S. caule simplici foliisque semiamplexicaulibus runcinato-pinnatifidis subtus glaucis glaberrimis, laciniis angulato-dentatis, racemo composito compacto terminali basi foliato, anthodiis laevibus. *Patria?*
- spicatus* Lam. 36. S. caule tereti elato ramoso glabro, foliis runcinatis subtus hirsutis, laciniis angulatis sinuato-dentatis, racemis paniculatis foliatis compactis, anthodiis laevibus. *Amer. bor.* (S. leucophaeus W., Prenanthes autumnalis Walt.)
- floridanus* 37. S. caule tereti elato foliisque petiolatis lyrato-runcinatis utrinque glabris, laciniis oblongis acutis denticulatis, floribus paniculatis, pedunculis subsquamosis. *Amer. boreal.* (S. lapponicus W. excl. syn.)
- alpinus* 38. S. caule simplici inferne glabro, foliis lyratis basi sagittatis glabris, laciniis terminali deltoideo-hastata, racemi terminalis bracteati pedicellis glanduloso-hispidis. *Europ. et Amer. bor.* (S. montanus Lam., coeruleus Sm., lapponicus Frölich., canadensis L.)
- macrophyllus* 39. S. foliis lyratis amplis petiolatis subtus hirsutis, petiolis alatis, floribus paniculato-corymbosis, pedunculis hirsutis. *Amer. bor.* (S. canadensis Fröl.)
- Plumerii* 40. S. foliis amplis lyrato-runcinatis subdenticulatis glabris, floribus paniculato-corymbosis, pedunculis bifidis bracteatis anthodiisque laevibus. *Gallia austr.*

+++ *Foliis pinnatifidis.*

- hispanicus* Jacq. 41. S. caule diffuse ramoso, foliis amplexicaulibus oblongis pinnatifidis glaucis albo-punctato-resinosus, pedunculis squamosis incrassatis, squamis anthodii ovatis scariosis subsquarrosis. *Hispania.* (Picridium pinnatifidum Lag.)
- chondrilloides* 42. S. caule ramoso, foliis dentatis glabris glaucis, inferioribus pinnatifidis, superioribus paucis lineari-lanceolatis, ramis 1floris elongatis, anthodiis laevibus. *Sicilia. Numidia.* (Scorzonera refedaefolia L.)