

## 217. PICRIDIUM.

*Desf. atl. 2. p. 220 — Dec. pr. 7. p. 182.*

1. P. VULGARE. *Desf. l. c. p. 221 — Pers. syn. 2. p. 362 — Sonchus picrioides. Lam. dict. enc. 3. p. 384 — Ten. fl. nap. 5. p. 181 — Bertol. fl. ital. 8. p. 398 — Scorzonera picrioides. Lin. sp. pl. 1114. Ic. All. ped. t. 16. f. 1 — Jacq. ic. rar. t. 577 — Sonchus asper, lacinatus, creticus. Bauh. pr. p. 60.*

Ad muros, ad rupes, et in cultis ubique.

Martio, Septembri. 24

Vulgo *Paparastiello*, et inter olera locum habet.

Species quoad *habitum*, et *folia* variabilissima; siquidem ista virentia, aut glaucescentia, 2-8 lin. lata, integra vel plus minus sinuato-dentata, lyrata, ac lyrato-pinnatifida; laciniis angustis, aut latis, denticulatis, saepe subfalcatis: *pedunculi* aliquando radicales: *anthodia* virentia, vel albo-farinosa: *flores* lutei.

## 218. SONCHUS.

*Dec. pr. 7. p. 184.*

1. S. FALLAX. *Wallr. in Dec. pr. 7. p. 185 — S. asper. Spr. s. veg. 3. p. 649 — Ten. fl. nap. 5. p. 180 — Bertol. fl. ital. 8. p. 392.*

*Ic. Fl. Dan. 893 — Sonchus laciniatus, spinosus. Dod. pempt. 643 — Fuchs. hist. 674.*

Aprili, Octobri. ⊙

Vulgo *Trunzo*, una cum sequente appellatur, et inter acetaria usurpantur. *Pedunculi* subumbellati, et *caules* superne piloso-glandulosi: *anthodia* glabra: *semina* ovalia, compressa, sulcata, levia, submarginata, in disco utrinque longitudinaliter tristriata, non transverse rugosa.

2. S. CILIATUS. *Lam. in Dec. pr. 7. p. 185 — S. oleraceus. Lin. sp. pl. p. 1116, ex parte — Ten. fl. nap. 5. p. 180 — Bertol. fl. ital. 8. p. 390.*

*Ic. Fl. dan. 682 — S. levis, latifolius. Dod. pempt. 643.*

*b. runcinatus*; foliis runcinatis.

*c. subbipinnatifidus*; foliis fere bipinnatifidis.

In cultis, in campis, et ad muros magis quam praecedens obvius.

Octobri, Julio. ⊙

*Pedunculi* subumbellati, subnudi, juniores ad apicem tomentoso-farinosi: *anthodia* glabra: *semina* subcompressa, nam fere cylindrica, non mar-

ginata, in disco utrinque tristriata, ac praeterea transverse rugulosa !; quo praesertim charactere a praecedente dignoscitur.

4. S. TENERRIMUS. *Lin. sp. pl. 1117 — Ten. fl. nap. 5. p. 181 — Bertol. fl. ital. 8. p. 395.*

Ic. *Reich. hort. t. 139 — Hieracium foliis in tenues lacinias profunde se-ctis, flore luteo. Pluken. phyt. t. 93. f. 3.*

b. *italicus*; foliis bipinnatifidis, laciiniis anguste linearibus — S. italicus. *Spr. s. veg. 3. p. 651.*

In herbosis super muros; *Casamicciola, Lacco, Forio, Ischia sopra i muri, ed al Castello.*

Octobri, Julio. ○, et aliquando basi H

Species quoad foliorum incisionem, et anthodii pubescentiam polymorpha; tamen semper glabra, laete virens: *pedunculi nudi, subumbellati: flores aurei: semina subtetragona, striata, transverse rugulosa.*

## 219. ANDRYALA.

*Lin. gen. pl. ed. Schreb. n. 1240.*

1. A. DENTATA. *Sibth. , et Smith fl. gr. pr. 2. p. 140 — A. integrifolia, b. Ten. fl. nap. 2. p. 200.*

Ic. *Sibth. fl. gr. t. 811.*

In herbosis apricis passim.

Majo, Junio. ○

*Flores intense sulphurei !, et duplo fere majores, quam in sequente — Cl. Bertol. in fl. ital. 8. p. 548, cum A. integrifolia conjungit; a qua quoad florum colorem aliasque notas prorsus aliena, nec apud nos unquam variat !*

2. A. UNDULATA. *Presl del. Prag. p. 113 — A. sinuata. Ten. fl. nap. 5. p. 200 ?*

Ic. *Hieracium marinum, tomentosum, incanum, Cichorii folio, flore can-dido sulphureo. Bon. t. 126.*

In collibus herbosis, et ad vias.

Majo, Junio. ○

*Anthodia setis purpurascensibus glanduliferis tomento intermixtis instru-cta: receptaculum pilosum — Potius haec varietas A. integrifoliae est, sub qua refertur a cl. Bertol., et a Dec., sed a praecedente diversissi-ma, habitu, et florum colore, qui in hac albidi vel pallidissime su-phurei !*