

*imbricatus, squamis obtusis margine membranaceis. Flosculi lutei ligulati. Semina pilosa. Pappus sessilis setosus dentatus. Receptaculum nudum. Planta Linnæo ignota, auctoritate Vaillanti, in Speciebus plantarum indicata. Vaillantius hanc perperam ad Catananthen reduxit, quæ cum nullo modo convenit W.*

## 1403. S O N C H U S.

*Gen. pl. ed. Schreb. n. 1233.*

*Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, ventricosus. Pappus pilosus sessilis.*

1. SONCHUS *maritimus.*

S. pedunculis subfoliariis terminalibus nudis, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. W.

S. pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. *Sp. pl.* 1116. *Cavan. ic.* 1. p. 38. t. 51. \* *Desf. atl.* 2. p. 223. \* *Allion. ped.* n. 818. t. 16. f. 2.

S. angustifolius. *Neck. gallob.* p. 326.

S. angustifolius maritimus. *Bauh. pin.* 124. prodr. 61. *Pluk. alm.* 354. t. 62. f. 5. *pesfina.* *All. nicaeens.* 84.

Chondrilla palustris longifolia sinuata laeviter spinosa. *Raj. suppl.* 137.

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 22.

*Seestrandts-Gänse-distel.* W.

*Habitat in Europa australi et Africa boreali.* 2. (v. f.)

\*2. SONCHUS *crassifolius.*

S. pedunculis subumbellatis squamosis, foliis lanceolatis amplexicaulibus acuminato-dentatis. W.

*Sonchus crassifolius.* *Pourret.*

*Dickblättrige Gänse-distel.* W.

*Habitat in Hispania.* 2. (v. f.)

*Medium tenet inter S. maritimum et arvensem sed priori affinior. Caulis simplex erectus. Folia lanceolata crassa glaucescentia, basi rotundata amplexicaulia, inaequaliter dentata, dentibus rectangule patentibus lanceolatis mucronatis. Flores magnitudine praecedent-*

*tis terminales subumbellati et in foliorum summorum axillis brevissimi pedunculi solitarii uniflori. Pedunculi calyce breviores squamosi. W.*

\* 3. **SONCHUS quercifolius.**

S. pedunculis subdichotomis subsquamosis, calycinis squamis adpressis, foliis oblongis sinuatis dentatis, caule fruticoso. W.

S. (*quercifolius*): caule fruticoso, foliis cuneiformibus, margine lobatis, lobis remotis acutis dentatis, terminalibus ternis. *Desf. atl. 2. p. 225. t. 213.\**

Eichenblättrige Gänsefistel. W.

*Habitat in Barbaria in montibus Cæsae. †*

Frutex bipedalis ramis carnosissimis crassitie digiti vel pollicis. Folia oblonga basi attenuata subcarnosa persistentia glabra sinuata dentata. Pedunculi pauciflori subdichotomi terminales squamis sparsis obsiti. Flores flavi magnitudine S. palustris. Calycis squamæ adpressæ. W.

4. **SONCHUS fruticosus.**

S. pedunculis ramosis subsquamosis, calycibus squarrosis, foliis lanceolatis runcinatis, caule fruticoso. W.

S. fruticosus glaberrimus, foliis lanceolatis sinuatis subpetiolatis, umbellis subtomentosis involuocratis, calycibus squarrosis glaberrimis. *Lin. suppl. 346. l'Herit. stirp. nov. p. 171. t. 81.\* Jacq. ic. rar. 1. t. 161. Collect. 1. p. 83.\**

S. pedunculis subsquamosis, foliis basi attenuatis, lyratis, lobis rotundatis obtusis, calycibus florentibus squarrosis. *Ait. Kew. 3. p. 115.*

Strauchartige Gänsefistel. W.

*Habitat in rupibus altis sylvarum Maderæ. Masson. † (v. v.)*

*Similis S. palustris. Caulis crassus spongiosus. Folia approximata pedalia lanceolata profunde sinuata, in petiolum margine tenuiori decurrentia, supra viridia, subtus glauca, utrinque glaberrima. Umbellæ terminales sæpe compositæ. Involucrum et involucellæ polyphylla, foliis ovatis recurvis. Pedicelli versus florem tomentosi et foliolis squamosi. Flores Taraxaci lutei, at pappus plumosus s. stipitatus. Calyx patulus imbricatus; squamis laxis, apice subrecurvis.*