

S. Tenerrimus, (Lin. sp. 1117.) Sur les murs, le long des sentiers; fl. en juin. ☉, quelquefois ♀.

S. Maritimus, (Lin. sp. 1116.) Bonnevaïne; fl. en juin et juillet. ♀.

S. Arvensis, (Lin. sp. 1116.) Dans les champs; fl. en juin et juillet. ♀.

S. Palustris, (Lin. sp. 1116.) Dans les lieux aquatiques; fl. en juin et juillet. ♀.*

Sous-Tribu VII. — *Hieracées*

Hieracium (Lin.)

H. Peleterianum, (DC. fl. fr. 5. p. 437.) Les lieux secs et élevés; fl. en juin et juillet. ♀. La fleur est plus petite que dans l'espèce de Mérat.

H. Murorum, (Lin. sp. 1128.) Dans les lieux montueux et couverts; fl. en mai et juin. ♀.

* Dans les communes de Miramàs et de St-Chamas, dans les lieux cultivés et humides, croît un *Sonchus* qui me paraît devoir constituer une espèce nouvelle par la fixité des caractères qui le distinguent des espèces voisines.

Ce *Sonchus* est annuel ou bisannuel, il est grand, son corymbe ombelliforme est très développé, les fleurs sont nombreuses, grandes, le réceptacle est hérissé de petites papilles dentées, la base de l'involucre n'est point renflée; ses feuilles sont larges et très longues, subroncinées, garnies de petits poils épineux sur le bord. Il est distinct du *S. Maritimus* par sa durée, sa grandeur, ses poils glanduleux et ses ombelles multiflores, du *S. Longifolius* parce qu'il n'a point les pédicelles tomenteux, du *S. Fallax* par ses involucrens ovales. On peut le désigner :

Sonchus decorus.

S. pedunculis involucrisque umbellatis multifloris glanduloso-pilosis; involucro ovato; foliis longissimis amplis basi sagittatis obtusis ferè integris margine spinulosis.

Dans l'herbier de Loiseleur Deslongchamps est un échantillon semblable à notre plante, placé comme variété du *S. Arvensis*, avec??