

DCCCXL. SONCHUS *Cass. dict. 25. p. 151. Less. syn. p. 140. excl. Lannææ* — *Sonchus et Atalanthus Don.* — *Sonchi sp. Linn. et auct.*

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. nudum. Achænia conformia exalata compressa crostria, longitudinaliter costulata, costulis sæpè transversè tuberculato-muricatis. Pappus mollis albissimus multiserialis, setis tenuissimis. — Herbæ polymorphæ aut rariùs frutices caule subspongioso. Folia varia. Capitula flava.

### Sect. I, ANOLEPTUS.

Capitula multiflora. Achænum longitudinaliter striatum, apice attenuatum ferè subrostratum. — Herbæ Capenses perennes glabræ. Invol. squamæ inter. margine scariosæ.

1. *S. DREGEANUS*, glaber glaucens, caulibus erectis teretibus, foliis linearibus, radicalibus basi subattenuatis, aliis integerrimis, aliis lobulis 1-2 acutis utrinque auctis, caulinis basi cordato-auriculatis, capitulis subcorymbosis, invol. basi tomentosis squamis int. margine scariosis.  $\mathcal{L}$  in Prom. Bonæ-Spei ad Klipplat-rivier, Zwartekey, Zwarkop-rivier, Zwarte-Storm et Willbergen legit cl. Drege et mecum comm. Herba 3-12 pollic. Achænia 3 lineas ferè longa striata utrinque attenuata. (v. s.)
2. *S. ECKLONIANUS*, glaber vix glaucescens, caule subnudo tereti simplici, foliis linearibus, radicalibus basi attenuatis plerisque pinnatim incisis lobulatisve, caulinis sessilibus (nec amplexicaulibus), capitulis paucis longè pedicellatis, invol. basi subtomentosi squamis inter. margine scariosis.  $\mathcal{L}$  in Prom. Bonæ-Spei distr. Uitenhagen legit cl. Ecklon et mecum comm. Priori valdè affinis sed minor. Capitula 2-3 longè pedicellata. Folia caulina parva basi non dilatata. Achænia breviora. (v. s.)

$\beta$ . foliis caulinis basi lobulatis. — Cum priori legit cl. Ecklon. (v. s.)

### Sect. II. EUSONCHUS. — *Sonchus Don.*

Capitula multiflora, basi subtumentia. Achænia apice truncata.

#### §. I. *Annui aut Biennes,*

3. *S. LONGIFOLIUS* (Trev. ind. sem. sem, vrat. 1818. nov. act. nat. cur. 13. p. 197), radice perpendiculari, caule erecto glabro ramoso, foliis glabris oblongis sinuatis cordatâ basi amplexicaulibus spinuloso-dentatis, pedicellis subumbellatis tomentosis, achæniis lævibus striatis.  $\textcircled{I}$  patr. ign. S. Australis hortul. Capitula ferè *S. arvensis*.
4. *S. ZACINTHOIDES*, caule erecto tereti ramoso, foliis caulinis oblongis subsinuatis spinuloso-dentatis amplexicaulibus, auriculis obtusis, paniculâ laxâ, pedicellis distantibus sæpiùs geminis, achæniis basi attenuatis minutè muricato-tuberculatis.  $\textcircled{I}$  ad Cap. Bonæ-Spei legit cl. Drege.
  - $\alpha$ . Caulibus versùs apicem pilis nigris glandulosis hispidis. — ad Olifant-rivier. Folia infima pinnatipartita, lobis rotundatis spinoso-ciliatis. (v. s. comm. à cl. inv.)
  - $\beta$ . Caulibus glaberrimis. — propè urbem Cap. Folia radicalia mihi ignota. (v. s. comm. à cl. inv.)
5. *S. ROYLEANUS*, caule erecto tereti glabro, foliis inf. . . . ., superioribus basi auriculis latis cordato-amplexicaulibus, dentibus grossis spinulâ molli aristatis instructis, apice acuminatis integerrimis, pedicellis nudis subumbellatis, invol. squamis ext. secùs lineam mediam dorsalem spinulas molles gerentibus, inter. glabris, achæniis oblongis basi subangustatis secùs nervulos minutissimè muriculatis.  $\textcircled{I}$  in Ind. orient. legit cl. Royle et mecum comm. Affinis *S. ciliato*, sed