

Род 1017. SONCHUS L.—ОСОТ

Корзинки многоцветковые. Покрывало черепичатое. Цветоложе голое. Все семянки одинаковые, сплюснутые, без носика и с летучкой из простых волосков, без венчика из щетинок снаружи. Травы с желтыми цветами.

(Из 70 видов, распространенных по всему Старому Свету, некоторые занесены в Америку, у нас 5).

- |                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. Многолетники . . . . . | 2. |
| Однолетники . . . . .     | 3. |

2. Семянки сильно сжатые, темно-бурые, на плоскостях с 5 поперек морщинистыми ребрышками. Веточки соцветия и листочки покрывала голые или с немногими железистыми щетинками. Корзинки шир. 7—9 мм. Листья ланцетные, цельные или перисто-выемчато-надрезные с курчавыми треугольными надрезами. Стебель выс. 60—150 см., ~~с~~ длинными, веревковидными корнями. М.—Сев.: Ствр. Куб. Тер. Чир. Даг. Гр.: Тиф. (сю) Аз.: Ган. (с) Ар.: Эр. На лугах, полях и сорных местах.

5448. *S. arvensis* L.

*V. villosus* (M B.)—Ножки соцветия, листочки покрывала и семянки гладкие.—Сев.: Куб. Тер.—Нередко.

Семянки слабо сжатые, почти четырехгранные, желтоватые, с толстыми гранями и 2—3 ребрами на плоскостях, слабо поперек морщинистые. Корзинки около 10—12 мм. шир. Листья мелко зубчатые, нижние выемчато-раздельные с ланцетными боковыми долями, верхние цельные, узко-ланцетные, длинно заостренные, при основании стреловидные с острыми ушками. Стебель очень высокий, 125—200 см. выс., внизу голый. Корневище короткое. М.—Сев.: Ствр. Куб. Тер. Чир. Даг Гр.: Кут. (ю) Тиф. (сю) Аз.: Ган. (сю) Бак. (с) Ар.: Эр. Тур.: Кар. Сурм. о. На болотистых местах.

5449. *S. paluster* L.

3. Семянки на плоскостях между ребрышками гладкие. Верхние листья при основании с округлыми, прижатыми к стеблю ушками. Корзинки 8—10 мм. шир. Листья цельные или чаще выемчато-надрезанные, жестковатые, с острыми, немного назад обращенными надрезами, кочече волнисто-зубчатые. О.—По всему Кавказу до средней горной зоны, на сорных местах.

5450. *S. asper* (L.) Hill.

Семянки на плоскостях между ребрышками поперек-морщинистые. 4.

4. Листья сосредоточены в нижней части стебля, глубоко перисто-рассеченные с перисто-рассечеными на треугольные, снабженные остроконечием дольки. Стебель выс. 30 см. Корзинки 8—9 мм. шир. О.—Даг. На сорных местах.

○ 5451. *S. eryngiifolius* D. Sosn. (ined.).

Листья по всему стеблю, цельные или чаще выемчато-надрезанные, перисто-раздельные или лировидные с крупной треугольной верхней долей, мягкие, волнисто-зубчатые, верхние при основании с острыми ушками. Стебель 30—100 см. выс. О.—По всему Кавказу до средней горной зоны, на сорных местах.

5452. *S. oleraceus* L.

Род 1018. MYCELIS Cass.

Корзинки малоцветковые, с 3—5 цветками. Покрывало из внешнего круга очень коротких листочек и внутреннего из более длинных.