

ut videtur diversus ex auriculis fol. amplissimis et invol. squamis exterioribus dorso setoso-subaculeatis. (v. s.)

6. *S. CILIATUS* (Lam. fl. fr. 2. p. 87. Picard diss. p. 13. cum icon.), caule erecto glabro aut rariū ad apicem piloso-glanduloso, folijs caulinis amplexicaulibus argutè dentato-ciliatis runcinatis aut indivisis, auriculis acuminatis, involucris pedicellisque glabriusculis, achæniis secùs nervulos transversè muriculato-rugosis. (I) in cultis Europæ et (fortè migrata) totius ferè orbis. Species, ut *S. fallax*, valdè polymorpha, semper tamen mitior. Huc referendi sunt *S. oleraceus* α et β Linn. sp. 1116. *S. oleraceus* α DC. fl. fr. n. 2895. *S. oleraceus* Wallr. sched. crit. p. 431. OEd. fl. dan. t. 682. Reichenb. fl. exc. 1. p. 234. *S. asper* Blackw. herb. t. 30. Gærtn. fr. 2. p. 360. t. 158. n. 6 non Fuchs. Bess., etc. *Hieracium oleraceum* Scop. carn. n. 975. *S. laevis* Vill. dauph. 3. p. 158. *S. oleraceus* A. B. C. D. E. Wallr! cat. comp. n. 362. Nec fortè satis differt *S. Sundiacus* Blume! bijdr. p. 888. Variat caule simplici aut ramoso, laevi aut apice piloso-glanduloso, foliis indivisis aut variè pinnatifido-runcinatis, ciliis molibus aut subrigidulis, etc. Conf. variationes in Wallr. et Picard II. cc. (v. v. et s.)
7. *S. FALLAX* (Wallr. sched. crit. 432. cum icon.), caule erecto glabro aut rariū ad apicem piloso-glanduloso, folijs amplexicaulibus argutè elongato-dentatis runcinatis aut indivisis, auriculis rotundatis, pedunculis involucrisque basi subhispidulis glabrisve, achæniis laevibus utrinque trinervulatis. (I) in cultis Europæ et (fortè migrata) totius ferè orbis. *S. spinosus* Lam. fl. fr. 2. n. 81. Picard diss. p. 10 non DC. Species quoad divisiones et spinescentiam foliorum, numerum capitulorum, etc., polymorpha, variationes per plurimas complectens, nempè huc referendi: *S. asper* Fuchs. hist. 674. ic. fl. dan. t. 393. opt. Bess. gal. n. 925. Reichenb. fl. exc. 1. p. 274. Schkun handb. t. 256. ic. fr. non Blackw. nec Gærtn. *S. oleraceus* γ et δ Linn. sp. 1117. *S. oleraceus* β asper DC. fl. fr. n. 2895. neconon *S. umbellatus* E. Mey.! in Drege coll. *S. ferox* Wallr! cat. comp. n. 358. *S. oleraceus* var. F. et G. Wallr! cat. comp. n. 362. *S. infestus* Poepp.! pl. exs. n. 236. *S. asper* Drege! coll. exs. *S. umbellifer* et *S. glaber* Thunb. fl. cap. p. 614 ex Less. Quoad variationum caracteres conf. Wallr. et Picard II. cc. (v. v. et s.)
8. *S. CUSPIDATUS* (Blume! bijdr. p. 888), glaber, radicibus napiformibus, caule erecto simplici tereti, foliis runcinato-pinnatifidis auriculis rotundatis amplexicaulibus aristato-dentatis, summis apice cuspidato-acuminatis, pedicellis nudis subumbellatis 1-cephalis, achæniis laevibus utrinque 3-nervulatis. (I)? ad cataractas fluvii Tjikundul in montosis Gede ins. Javæ legit cl. Blume. Herba omnino S. fallaci affinis, sed mitior et radices napiformes ex cl. Blume. (v. s.)
9. *S. ERNGIODES*, caule erecto tereti glabro apice ramoso, foliis infer. summis glabris profundè cordato-amplexicaulibus orbiculatis, profundè spinoso-dentatis, paniculæ laxæ pedicellis subumbellatis setis glandulosis hispidis, invol. glabris, achæniis oblongis compressis utrinque 5-nervulatis laevibus aut sub lente tenuissimè submuriculatis. (I)? in ins. Mauritii legit cl. Bouton. Plantæ pars inferior mihi ignota. An fortè *S. fallacis* var.? (v. s. comm. à cl. inv.)
10. *S. CAROLINIANUS* (Walt. fl. car. 192. Ell! sketch 2. p. 255), glaber, caule erecto, foliis lanceolatis acutis undulatis spinuloso-dentatis basi auriculatis et semiamplexicaulibus, capitulis subumbellatis, achæniis laevibus utrinque subtrinervulatis. (I) in pinguibus et humidis ad ripas fluviorum in Carolinâ (Ell!) et in Louisiana (Teint.). Cor. flavæ. Achænia compressa striata ferè laevia. (v. s.)
11. *S. SPINULOSUS* (Big. fl. bost. ed. 2. p. 292), caule erecto laevi pauci-angulato, foliis amplexicanibus oblongis undulatis dentato-spinulosis, capitulis subumbellatis, invol. paululum piloso-glandulosis. (I) in America borealis paludibus salsis circà Bostoniam. Achænia indecer.
12. *S. WALLICHIANUS* (DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 97), glaber, radice perpendiculari, caule erecto tereti, foliis elongatis obtusè auriculatis semiamplexicaulibus pinnatifidis spinuloso-dentatis, lobis ovalis, terminali elongato, pedicellis