

Hab.—Teruel, le long de la voie ferrée. *Inter parentes*.

Note.—A remarquer la grande différence du *C. tenuifolia* Duf. de Teruel comparé au *C. tenuifolia* var. *tenuiloba* Boiss. de Valence. Tellement qu'on serait porté à considérer deux espèces.

N.º 213. **Centaurea Senneni** Pau.

Présente, tant dans les feuilles que dans les calathides, des traces des faciès de *Centrophyllum lanatum*.

Note.—Ne doit pas être confondue avec le *C. Senniana* Rouy, que nous avons communiqué de Bédarieux comme un *Calcitrapa* × *diffusa* Sennen.

N.º 566. **Sonchus Fabræ** Senn. = *S. lacerus* in sched., non Willd.

Caulis simplex, sinuosus, parum altus, dense foliosus; folia dense pinnatisecta; calathides parum numerosæ in falsa umbella, vel etiam pedunculi solitarii; ligulæ bracteis plane longiores, externe roseæ.

Racine pivotante non ramifiée, mais munie seulement de fibres latérales filiformes; tige simple-sinueuse, peu élevée, d'apparence glabre, mais en réalité sublanugineuse à la base densément feuillée, et munie supérieurement de rares et minuscules glandes apodes, flavescence striulée; feuilles densément et esthétiquement pennatiséquées, à pinnules réfractées-sinuées-lobulées-spinulées, les caulinaires moyennes et supérieures embrassantes-auriculées; les auricules supérieures en pointe, les inférieures arrondies, toutes finement denticulées; calathides peu nombreuses en fausse ombelle ou même à pédoncules solitaires; péricline sombre à bractées lancéolées-aiguës très inégales, les extérieures plus ou moins pileuses-subglanduleuses, les longues arrivant à la hauteur de la ouate des aigrettes; ligules de moitié plus

longues, lavées de rose à l'extérieur; akènes bruns-atténués très finement papilleux, denticulés sur le contour.

Hab.—Gérone: Figueras et Llers, olivettes, champs; Barcelone sur plusieurs points par les coteaux.

Note.—Plante dédiée en tribut d'honneur au généreux fondateur de l'“Observatorio Fabra” du sommet du Tibidabo.

N.^o 3623. *Lactuca serratifolia* Senn.; st. *virosa*.

Caulis densi denseque striati; folia inferiora læte virescentia, limbo auriculato amplexicauli; inflorescentia late pyramidalis; periclinium bracteis exterioribus brevissimis; achænia subito in rostrum breve attenuata.

Tiges épaisses densément striées dans la ramification étroitement aiguë; feuilles inférieures létévirescentes, non décurrentes sur la tige creuse-sombre; limbe largement elliptique lobulé-denticulé décurrent sur le pétiole, auriculé-embrassant, spinuleuses sur la nervure médiane; inflorescence largement pyramidale, dressée, munie aux bifurcations de feuilles rudimentaires sombres terminées en pointe et arrondies en auricule sinué-sublobulé à la base; péricline à bractées extérieures très courtes, ovales ou lancéolées, très sombres; les intérieures étroites-longues-virescentes atteignant presque le sommet des aigrettes; akènes d'un noir rubescent brusquement atténuées en bec court, à ne pas confondre avec le pédicule blanc des aigrettes, parcourus de fines lignes ponctuées, les bords relevés d'une bande en saillie striulée-sinuée en travers.

Hab.—Cerdagne: Llivia à Roca Canal, vers 1270 m.

N.^o 3857. *Lactuca Mulsanti* Senn. et. El.; st. *Scariola*. = *L. dubia* in sched, non Jordan.

Caulis tenuiter striatus; folia oblonga, longiter auriculata, in nervo medio spinosa; periclinium bracteis