

CCCLXII. SONCHUS L. Gen. ed. SCHREB. p. 527.

1133. *Sonchus alpinus* L. Sp. p. 1117. BALB. et NOCC. *Fl. ticin.* l. p. 135.
— *Mulgedium alpinum* LESS. ex DC. Prodr. 7. p. 248.

Ic. *S. coeruleus latifolius* CHABR. Sciagr. p. 316.

In montibus Tendae Rev. MONTOLIVO, in montibus albingaumensibus
VIV. herb., in apennino Lig. orientalis TRAVERSO.

1134. *Sonchus tenerrimus* L. Sp. p. 1117. DC. Prodr. 7. p. 186. ALL.
Fl. ped. 1. p. 223. BERTOL. *Pl. genuens.* p. 181. TURIO *Pl. clavar.* p. 24.

Ic. *Chondrilla lutea* CHABR. Sciagr. p. 317. mala.

Ad muros, tectos etc. secus litora passim. ♂

Planta polymorpha, de qua cf. BERTOL. l. c.

1135. *Sonchus fallax* WALH. — ex DC. Prodr. 7. p. 185. — *S. oleraceus*
γ. δ. L. Sp. p. 1117. BERTOL. *Pl. genuens.* p. 180. λ? TURIO *Pl. clavar.*
p. 24.

Ic. *S. aspera vulgi* LOB. Icon. p. 234.

* *decepiens*, foliis ruminato-pinnato-partitis, segmentis valde recurvatis,
linearibus oblongisve dentatove-angulatis plus minusve spinulosis, ramis
superne, pedunculisque subumbellatis nigro-glandulosis pilosis, antho-
diis maiusculis, involucri foliolis nigricantibus setoso-glandulosis cilia-
tisve, acheniis striatis, margine minute denticulatis ciliolatis, caeterum
laevibus.

In arvis, ruderatis vulgaris. (1)

Planta mire polymorpha, at acheniis non muricatis a sequente optime
distinguitur; in varietate folia ampliora, profundius divisa, anthodia gran-
diora nigricantia, speciem propriam pene indicare videntur: *S. nigricans*
TAUSCH (DC. Prodr. 7. p. 190.) huc forte referendus etiamsi glaberrimus
ex descriptione l. c.

1136. *Sonchus ciliatus* LAMCK. — DC. Prodr. 7. p. 185. — *S. oleraceus*
WALH. — *S. oleraceus* α. β. L. Sp. p. 1116. BERTOL. *Pl. genuens.* p.
180. α.

Ic. *S. laevis vulgaris* etc. LOB. Icon. p. 235.

Iisdem locis ac praecedens. (1)

1137. *Sonchus arvensis* L. Sp. p. 1116. DC. Prodr. 7. p. 187. TURIO *Pl.*
clavar. p. 24.