

*Crupina Crupinastrum* Vis. Reg. Murc. in pascuis de Alcaraz.  
sol. cal. alt. 1600-1800 m. Iul.

*Sonchus crassifolius* Pour. Reg. Murc. in pascuis salsuginosis  
planitiei inter pag. Albacete et Balazote,  
sol. cal. alt. 7-800 m. Iun.

\* » *Freynianus* Hut. Port. et Rig. Suffrutescens pedalis  
ed ultra; caudice lignoso multicipite;  
caulibus erectis vel adscendentibus ad  
medium dichotome-divaricato-ramosis-  
simis coespitem intricatum formantibus  
glabris viridibus, ad ramorum ortum  
squamas brevissimas acutas externe  
glabras, interne lanato-floccosas per-  
sistentes gerentibus, ramisque spine-  
scentibus; fol. ad basim ramorum con-  
gestis liberis vel ramos amplexantibus,  
late linearibus ad medium longe run-  
cinato-dentatis et calloso-cuspidatis,  
summis integris; calathiis solitariis,  
paucifloris; anthodii squamis glabris  
obtusis basi 3-5 nerviis, dorso viride-  
carinatis late albo-marginatis; acheniis  
sub apice paululum expansis 5 costatis  
scaberrimis pappo brevioribus. Reg.  
Granat. in aridis petrosis barranco del  
Caballar supra urb. Almeria. sol. schist.  
alt. 80-100 m. Apr. Mai.

» *tenerrimus* L. b. *perennis* Lge. Reg. Granat. inter  
Cactos circa urb. Almeria sol. schist.  
alt. 10-40 m. Apr.

» *pastulatus* Wk. Reg. Granat. in rupium fissuris  
barranco del Caballar pr. Almeria. sol.  
schist. alt. 20-60 m. Apr.

*Lactuca tenerrima* Pour. Reg. Murc. in pascuis saxosis ad  
oras Puerto de la Cadena sol. cal. alt.  
5-600 m. Mai.