

Heldreich als *C. macroacantha* ausgegeben worden, welche aber ungetheilte Blätter hat.“ Dr. Ascherson brieflich. — Blätter tief-fiederspaltig. Dornen der Hüllblättchen bis 1½ Zoll lang, sehr stark, am Grunde von seitlichen Dornen fiederig. Antheren und Griffel wie bei *C. hellenica*. Alle Achenen ohne Pappus. (Die Art in Mittel-, die Varietät in Süd-Europa).

Crupina Crupinastrum Vis. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Ital., Span.) Die ausgewachsenen Cotyledonen verkehrt-eiförmig, in den Stiel verschmälert; Stiel 1—2“ lang, Fläche 6“ lang, 4“ breit, adernetzig.

Centrophyllum dentatum DC. Syra. S. (Macedon.) Sect. b. *Odontognathia* DC. ex Endl. Gen. Plant. Nr. 2874.

C. leucocaulon DC. Syra. S. — Sect. a. *Atraxyle* DC. ex Endl. l. c.

C. lanatum DC. Syra, Cania. S. (Krain, Süd-Tirol, Frkr., Port.) Bildet den Uebergang zwischen den Sect. a. *Atraxyle* und b. *Odontognathia* DC., weil alle oder doch die meisten der inneren Hüllblättchen an der Spitze in ein wimperig-gesägtes Anhängsel verbreitert sind.

Calendula arvensis L. Zante, Syra, Tinos. Fr.; β . *rugosa* Vis. Canea. (Mittel- und Süd-Europa).

Sonchus oleraceus L. Syra, Canea. Fr. (Ganz Europa). Die Beschreibung der Achenen ist meist ungenau. An meinen Exemplaren aus Syra und Canea (sowie an solchen aus Böhmen) haben die Früchtchen an der flachen Seite viele quengerunzelte Längsstreifen von ungleicher Stärke, welche nur feine Zwischenräume zwischen sich lassen; der Rand ist wegen der Runzeln des Randstreifens gezähnt.

Sonchus graecus Reuter msc. in hort. Genev. = *S. glaucescens* Jord. var. *lusca* Boiss. herb. teste Reuter. Syra. April, Mai. Achenen elliptisch, an der flachen Seite mit 3—5 feinen Streifen und glatten Zwischenräumen, Rand fein gezähnt.

Lactuca cretica Desf. Syra. (Macedon.)

Chondrilla juncea L. Canea. S. (Mittel- und Süd-Europa).

Crepis fuliginosa S. et Sm. Zante, Syra, Tinos. Fr.

Crepis vesicaria L. β . *scariosa* Vis. Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frkr., Span.)

In der Form der Blätter sehr veränderlich.

Crepis foetida L. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Crepis bulbosa Tsch. Syra. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Picridium vulgare Desf. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.) für Griechenland neu.

Endoptera dichotoma Boiss. Syra, Tinos, Canea. Mai. Bisher nur aus Smyrna bekannt.

Zacyntha verrucosa Grtn. Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr. Span.)

Tragopogon australis Jord. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Süd-Frkr.)

Podospermum laciniatum DC. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).